

ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG

ELŐADÓK: Mészáros Ferencné

ENGEDÉLYSZÁM: 2670/2005.



TÁRGY: FOLICUR PLUS WG
iker-csomagolású gombaölő
permetező-szer forgalomba
hozatali és felhasználási
engedélye

OLDALAK SZÁMA: 4

ENGEDÉLYOKIRAT

Bayer CropScience AG.
Németország

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11. § (1) bekezdése, illetve a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a

FOLICUR PLUS WG iker-csomagolású gombaölő permetező-szer

forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel engedélyezem:

1. A hatóanyag és a növényvédő szer gyártója:

Folicur 25 WG : Bayer CropScience AG., Németország
Merpan 80 WDG: Makhteshim Chemical Works Ltd., Izrael

Az engedély tulajdonosa: Bayer CropScience AG., Németország.

Az engedély tulajdonos hazai képviselője:

Bayer Hungária Kft., Bayer CropScience, Budapest

2. A növényvédő szer rendeltetése: iker-csomagolású gombaölő permetező-szer

3. A növényvédő szer összetétele:

1,0 kg Folicur 25 WG (250 g/kg tebukonazol) és
2 x 1,25 kg Merpan 80 WDG (80 % kaptán)

4. Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG).

5. Előírt minőségi feltételek:

Folicur 25 WG a 48138/2000. FVM számú engedélyokiratban foglaltak szerint.
Merpan 80 WDG a 24273/1997. FM számú engedélyokiratban foglaltak szerint.

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra	károsító	kijuttatáshoz szükséges	
		szer (kg/ha)	víz (l/ha)
		mennyisége	
almatermésűek	almafalisztharmat, almafavarasodás	Folicur 25 WG: 0,5 Merpan 80 WDG: 1,25	800-1000

Az ikercsomagolású kiszerezés 2 ha kezelésére elegendő.

Az előírt növényvédelmi technológia:

Almatermésűekben almafavarasodás és almafalisztharmat ellen a védekezéseket a pirosbimbós fenológiai állapottól preventív módon javasolt elkezdeni. A permetezéseket 7-10 naponként a fertőzés erősségétől függően végezzük el. Varasodás ellen a kombinációt blokkszerűen javasoljuk felhasználni az aszkospóra szóródás intenzív szakaszában 2-4 alkalommal a fertőzés erősségétől függően megismételve. A kombináció felhasználása rezisztenciatörő hatású lehet más hatásmechanizmusú, varasodás ellen blokkszerűen alkalmazott technológiák kiegészítése esetén.

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:


a) Mérgező (toxikológiai) tulajdonságok:

R mondatok:

- R 23 Belélegezve mérgező (toxikus)
- R 36 Szemizgató hatású
- R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
- R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
- R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R 63 A születendő gyermeket károsíthatja.

S mondatok:

- S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
- S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
- S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
- S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/ permetet nem szabad belélegezni
- S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást
- S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni



- S 45 Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni
- S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
- S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.
- S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell érni/Biztonsági adatlap

Veszélyjel:



mérgező



környezeti veszély

- b) Tűzveszélyesség: tűzveszélyes (C).
- c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.
A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság min. **200 méter**, illetve az egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint.
- d) Méhveszélyesség: nem jelölés köteles.

Különleges S-mondatok:

„SP1” „A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!”

8. Várakozási idők:

- a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 4 nap.
- b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
almatermésűek	28

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Az alkalmazás során előírt egyéni védőeszközök, illetve a felsoroltakkal legalább egyenértékű védelmet nyújtó eszközök *előkészítőknak*: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli; *kijuttatóknak*: védőruha, védőkalap, védőszemüveg, FFP2D (SL) szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd **általános eljárás**/ orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: Tüneti- megfigyelő kezelés!



10. **Forgalmazási kategória:** II.
11. **Eltarthatóság:** eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.
12. **Az engedély érvényessége:** 2007. április 3.
13. **A címketerv elfogadására vonatkozó döntés a termékcímkére vonatkozóan:**
- A növényvédő szer csak a jóváhagyott címketerv szerinti tartalommal elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Budapest, 2006. január 25. nap

Dr. Halmágyi Tibor
főigazgató

Dr. Mihály Botond Gábor
engedélyezési igazgató

P.H.

Kapja: Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience, Budapest

(2/2006.)

