

## **A répacukor (szukróz, szacharóz, nádcukor, asztali cukor) felhasználási feltételei**

**A készítmény:** tiszta szacharózból készített por oldata.

**Rendeltetés:** a természetes védelmi mechanizmusok megerősítése révén fejt ki (elicitor) hatását.

**Felhasználási technológia:** A hideg vizes oldatot közvetlenül a kijuttatás előtt javasolt elkészíteni és kora reggel (9 óra előtt) kijuttatni.

**Almafélék** (*Malus pumila*, *Malus domestica*) védelmére gyümölcsfűró rovarok, pl. almamoly (*Cydia pomonella*) ellen. Az oldatot tavasztól nyárig a levélrügyek kipattanásától virágzás végéig (BBCH 6-69) célszerű alkalmazni. A vegetációs periódusban 7-10-szer alkalmazható 15 napos kezelések közötti idővel. A kijuttatandó répacukor oldat javasolt koncentrációja 1 g répacukor/100 l. Egy hektárra 600-1000 liter oldatot célszerű kipermetezni, ügyelve arra, hogy a kijuttatott cukor összmenyisége 42-100 g/ha közé essen. Várakozási idő tartása nem szükséges.

**Csemegekukorica** (*Zea mays*) védelmére kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) ellen. Az oldatot tavasztól nyárig, 1-2 leveles állapot kialakulásától címerhányás kezdetéig (a hímvirágzat csúcsa megjelenik) (BBCH 12-51) célszerű alkalmazni. A vegetációs periódusban 3-4 alkalommal lehet kijuttatni a készítményt 15 napos kezelések közötti idővel. A kijuttatandó répacukor oldat javasolt koncentrációja 1 g répacukor/100 l. Egy hektárra 200 liter oldatot célszerű kipermetezni, ügyelve arra, hogy a kijuttatott cukor összmenyisége 6-8 g/ha közé essen. Várakozási idő tartása nem szükséges.

Az Európai Bizottság felülvizsgálati jelentése a répacukorról [innen](#) letölthető.