

ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG

ELŐADÓK: Baranyi Tibor
Mészáros Ferencné

ENGEDÉLY SZÁMA: 1073/2005.



TÁRGY: MARSHAL 25 EC
rovarölő talajfertőtlenítő szer
forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének
módosítása és kiegészítése

OLDALAK SZÁMA: 3

ENGEDÉLYMÓDOSÍTÁS

FMC Corporation
Amerikai Egyesült Államok

Határozat

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11. § (1) bekezdése, illetve a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a *Marshal 25 EC rovarölő talajfertőtlenítő szer* 28479/1991 FM számú korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint

módosítom és egészítem ki:

4. Felhasználható:

kultúra	károsító	kijuttatáshoz szükséges	
		szer	víz
		mennyisége	
		l/ha	l/ha
mák	fekete mák gyökérmányos	2,0	28 sorkezeléssel
új telepítésű gyümölcsösökben telepítés előtt (almatermésűek, csonthéjasok, bogyósok)	cserebogár pajor, drótférgek	5	300-500 talajpermetezéssel felületkezeléssel
nem termő, termő gyümölcsös (almatermésűek, csonthéjasok)	cserebogár pajor, drótférgek	5	25-30 l/fa injektálással
bogyósok	cserebogár pajor, drótférgek	5	1 l/tő injektálással
szőlő, gyümölcs, kertészeti és erdészeti telepítés, faiskola, ill csemetekert	cserebogár pajor, drótférgek	5 1-1,6 %	300-500 talajpermetezéssel

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idő:

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)
mák, gyümölcsös, szőlő	90

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

Raktáron lévő tételek a korábbi címkével forgalmazhatók!

Melléklet

1. Javasolt növényvédelmi technológia:

Mákban a fekete mák gyökérormányos és drótférges ellen a védekezéseket vetést megelőző kártevő felmérés alapján célszerű elvégezni. Ha a drótférges, ormányosbogarak száma meghaladja a 4-5 db/m² a talajfertőtlenítő szer alkalmazása indokolt. A megelőző védekezést a vetéssel egy menetben kell elvégezni a vetőgépre szerelt perisztaltikus pumpa alkalmazásával. A kijuttatás során a jó hatékonysághoz biztosítani kell az engedélyokiratban kötelezően előírt permetlémenyiséget.

Gyümölcsösökben, szőlőben, kertészeti és erdészeti faiskolában, telepítés táblákban a fiatal lárvák ellen a védekezéseket talajvizsgálat ismeretében kell végrehajtani. Fiatal fák esetében 0,5-1 db pajor/fa felett, termőre fordult idősebb fák esetén pedig 3-5 db pajor/fa egyedszámnál a védekezések javasoltak. Szőlő, gyümölcsös és faiskolai telepítés táblákban, erdészeti csemetekertekben a talajra kipermeteztet készítményt sekélyen a talajba kell bedolgozni. A kezeléseket termő és nem termő ültetvényekben a kora tavaszi időszakban kell elkezdni és a második kezelést legkésőbb július végéig fajtától függően, de a szüret várható időpontja előtt legalább 90 nappal be kell fejezni. Termőkorú gyümölcsösökben (alma-termések, csonthéjasok, bogyósok) és szőlő esetében a készítményt a fák esetében 4 helyen történő, szőlő és bogyósok esetében pedig egy helyen történő talajba injektálással kell kijuttatni. Ügyelni kell, hogy a permetlé a gyökérzóna körül egyenletes eloszlású legyen és beinjektálást követően a lyukakat azonnal be kell taposni.

Az injektáló szúrscsapját a permetlé visszacsapódásának elkerülése érdekében védőlemezzel kell ellátni.

A kezelt kultúrnövény és a károsító(k) kezeléskori fenológiai stádiumai: mákban vetéssel egy menetben, nem termő ültetvényekben, szőlő gyümölcs faiskolákban, erdészeti csemetekertekben a telepítés előtti időszakban, termő nem termő ültetvényekben kora tavaszszal és nyár közepén az adott fenológiai állapotban.



Egyéb különleges feltételek/korlátozások: mákban a készítmény kijuttatásához perisztaltikus pumpa szükséges


Budapest, 2005. június „ ”

Dr. Halmágyi Tibor
főigazgató

P.H.

Dr. Ocskó Zoltán
engedélyezési igazgató

Kapja: Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest



(75/2005.)