

ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG

ELŐADÓ: Mészáros Ferencné

ENGEDÉLYSZÁM: 1918/2005.



TÁRGY: FOLICUR 25 WG
gombaölő permetezőszers
forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének
módosítása és kiegészítése

OLDALAK SZÁMA: 2

Bayer CropScience AG.
Németország

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11. § (1) bekezdése, illetve a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a **Folicur 25 WG gombaölő permetezőszers** 48138/2000. FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint

módosítom és egészítem ki:

1. A növényvédő szer hatóanyag, a növényvédő szer és az engedély tulajdonosa:
Bayer CropScience AG., Németország

Az engedély tulajdonos képvisellete:

Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience, Budapest

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra	Károsító	kijuttatáshoz szükséges	
		szer (kg/ha)	víz (l/ha)
cseresznye, meggy	monília virág és hajtásfertőző betegség, blumeriellás levélfoltosság	0,75-1,0	800-1200
kajszibarack	gnomóniás levélfoltosság		
őszibarack	levélfodrosodás	1,0	800-1000

Az előírt növényvédelmi technológia:

A védekezést a monília elleni fertőzésre alkalmas időszakban (párás, nedves, csapadékos, hűvös időjárásnál) általában a virágzás kezdetén kell megkezdeni, majd a virágzás menetétől és az időjárás alakulásától függően további 1-2 alkalommal (50 %-virágzásban, szíromhullás kezdetén) célszerű azt megismételni. Az egyes kezelések között - a fitotoxikus hatás elkerülése végett - legalább 4-5 napos permetezési fordulót javasolt tartani. Az ültetvény művelésmódjától (koronaforma, sor- és tőtávolság), az alkalmazott géptípustól függően 800-1200 l/ha permetlét kell kijuttatni. A nagyobb térállású cseresznye ültetvényekben, a nagyobb korona-átmérőjű-, nem ritkított koronájú csonthéjas gyümölcsösűeknél a magasabb lémenyiség felhasználása javasolt. Magas fertőzési nyomás (pl. gondozatlan gyümölcsös, előző évi súlyos fertőzés, monília gyümölcsmúmiák jelenléte, mély fekvésű terület, fogékony fajta, stb.) esetén célszerű a készítményt kontakt hatású szerves hatóanyagú gombaölő szerekkel (pl. kaptán, mankoceb, stb.) kombinációban kijuttatni, fokozottan ügyelve a lombkorona egyenletes permetléfedésre.

8. Várakozási idők:

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
cseresznye, meggy, őszi- és kajsziabarack	14

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanul érvényesek.

Budapest, 2005. november „ 22. „

Dr. Halmágyi Tibor
főigazgató

Dr. Mihály Botond Gábor
engedélyezési igazgató

P.H.

Kapja: Bayer Hungária Kft., Bayer CropScience, Budapest.

(136/2005)

