



ELŐADÓ: Csaba Eszter
ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/625/1/2007.
OLDALAK SZÁMA: 6
MELLÉKLET: 1 db címketerv

TÁRGY: MYCOSTAR gombaölő
permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint engedélyező hatóság a Syngenta Ltd. (Nagy-Britannia) képviseletében eljáró Syngenta Kft. (Budapest) ügyfélnek a Mycostar gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság a Mycostar gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételek mellett adja ki:

1. A hatóanyag és a növényvédő szer gyártója, az engedély tulajdonosa:
Syngenta Ltd., Nagy-Britannia

Az engedély tulajdonos hazai képviselete: Syngenta Kft.
(1123. Budapest Alkotás utca 41.)

2. A növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer

3. A növényvédő szer összetétele:

Hatóanyag megnevezése és részaránya:

- ISO szerinti közhasználatú név: klórtalonil
- IUPAC név: *tetra-klór-izo-ftalonitril*
- CAS-szám: 1897-45-6
- részaránya: 500 g/l

4. Szerforma: szuszpenzió koncentrátum (SC)

5. Előírt minőségi feltételek:

5.1. hatóanyag tartalom: klórtalonil (GC): 40,0 \pm 2,0 % (m/m)

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

5.2	Kiönthetőség (MT 148):	max. maradék 4 %
5.3	Szuszpenzió stabilitás (MT 161):	min. 90 %
5.4	Nedves szitálási maradék (MT 59.3): (75 µm-es szitán)	max. 1 %
5.5	Habképződés (MT 47.2): (1 perc után)	max 60 ml;

Tárolási stabilitás:

Tárolási stabilitás 0 °C (CIPAC MT 39.3):	meg kell felelnie az 5.2 és 5.3 előírásainak.
Tárolási stabilitás 54 °C (CIPAC MT 46.3):	a mért hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95 %-a, és meg kell felelnie az 5.2, 5.3 és 5.4 előírásainak.

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges	
		szer	víz
		mennyisége(l/ha)	
kalászosok (őszi)	kalász- és levélbetegségek	2,0	300-400
lucerna	levélragya	3,0	400-600
burgonya	burgonyavész, alternáriás levélfoltosság	2,0-2,2	600-800
almatermésűek	varasodás	2,5-3,0	800-1000
őszibarack	tafrinás levélfodrosodás	2,5	800-1000
szőlő	peronoszpóra	2,5-3,0	600-1000
paradicsom (szabadföldi és hajtatott)	alternária, szeptória, paradicsomvész, szürkepenész	2,2-3,0	400-1500
uborka (szabadföldi és hajtatott)	peronoszpóra	2,5	400-1500
borsó	peronoszpóra, rozsda	2,5	300-500
	csávázás: csírákori betegségek	2,0 l/t + egyéb csávázó szerrel kombinációban	

Előírt növényvédelmi technológia:

A Mycostar hosszú hatástartamú, kontakt hatású gombaölő szer. A védekezést lehetőség szerint az előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel javasolt végezni.



Őszi kalászosokban a készítményt – lizstharमत, valamint rozsdá- és üszögbetegségek kivételével – levél és kalászbetegségek elleni védelem céljából kalászhányás végén, virágzás kezdetén célszerű kijuttatni. Szükség esetén, lizstharमत elleni védelem céljából erre a célra engedélyezett készítményekkel – a keverhetőség ellenőrzése után – kombinálható.

Burgonyában és lucernában a védekezést az előrejelzésre alapozva, vagy legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor kell megkezdeni, s szükség szerint – a fertőzés erősségétől és a környezeti feltételektől függően – 10-12 naponként meg kell ismételni.

Almatermésűekben varasodás ellen a védekezést az aszkospóra szóródás időszakában, megelőző jelleggel kell elkezdni. A továbbiakban a kezeléseket a fertőzési veszély alakulása szerint, 8-10 napos gyakorisággal szükséges folytatni. Preventíven kijuttatva a készítmény erős fertőzési nyomás mellett is tartós védelmet biztosít a kórokozóval szemben.

Őszi barackban tafrinás levélfodrosodás ellen a rezes lemosó permetezések után, megelőző jelleggel kell a kezeléseket végrehajtani. A fertőzési veszélytől függően a permetezést 7-10 napos gyakorisággal javasolt megismételni.

Szőlőben peronoszpóra ellen a védekezést preventíven kell megkezdeni, általában amikor a hajtások átlagos hossza eléri a 20-25 cm-t. A fertőzési kockázattól függően a további permetezéseket 7-10 napos időközökkel ajánlott folytatni.

Paradicsomban paradicsomvész ellen a kezeléseket megelőző jelleggel, lombzáródás előtt kell megkezdeni, míg szürkepenész, szeptóriás és alternáriás betegség ellen a virágzást követően, az első tünetek megjelenésétől javasolt védekezni. Csapadékos időben vagy öntözött körülmények között – a fertőzés erősségétől függően – a kezelést célszerű 7-10 naponként, többször megismételni.

Szabadföldi és hajtatott uborkában peronoszpóra ellen előrejelzés alapján megelőző módon, illetve a kezdeti tünetek megjelenését követően 7-10 napos időközökkel, 3-4 alkalommal javasolt védekezni.

Borsóban a csírákori betegségek ellen a készítményt nedves csávázással, a szélesebb hatásspektrum érdekében más csávázó szerrel kombinálva kell a mag felületére felvinni. A csávázás során 2 l/t ragasztószer hozzáadása szükséges.

Peronoszpóra és rozsdá ellen két lombleveles állapottól a virágzásig megelőző jelleggel, illetve a kezdeti tünetek észlelésétől 7-10 naponként ajánlott permetezni. A megfelelő tapadás érdekében a permetléhez nedvesítő szer hozzáadása szükséges.


Az okiratban a kijuttatáshoz feltüntetett vízmennyiségek javasolt értékek. A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.

Légi kijuttatás: -

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

Veszélyjel:



R-mondatok:

- R 36** Szemizgató hatású
R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

S-mondatok:

- S 2** Gyermek kezébe nem kerülhet
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 20/21 Használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 36/37/39 Megfelelő védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, arc/szemvédő viselése szükséges
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): 4200 mg/kg

b) Tűzveszélyességi besorolás: **tűzveszélyes – (C) tűzveszélyességi osztály**

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: **kifejezetten veszélyes**

A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság minimum **200 méter**, illetve az egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint.

A szer maradékát a biztonsági adatlapban megadott előírások szerint kell ártalmatlanítani.

A csomagolási hulladékokra a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésre a 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

d) Méhekre való veszélyesség: **nem jelölésköteles**

Különleges S-mondatok:


SPI A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizet!

8. Várakozási idők:

a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 1 nap

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
kalászosok (szem), lucerna	7
burgonya	7
paradicsom, borsó (zöld, takarmány)	7
uborka	3
almatermésűek	21
őszibarack	7
csemegeszőlő	30
borszőlő	30



9. Munkaegészségügyi óvőrendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.

Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli. Zárt térben (fóliaház) végzett permetezéskor – a fentiek mellett – FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőosztályú légzésvédő félálarc.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, kiömlését a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és felsőruha váltása szükséges.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés. A mérgezett személyt hánytatni tilos!

10. Forgalmazási kategória: II osztály

11. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

12. Az engedély érvényessége: 2014. február 17.

13. A címketerv elfogadására vonatkozó döntés a termékcímkére vonatkozóan:


A növényvédő szer csak jelen határozat mellékletét képező jóváhagyott címketerv alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Egyéb előírások:

Amennyiben a referencia termék, a **Bravo 500 gombaölő permetezőszer** engedélyokiratában változás következik be, jelen engedély tulajdonosának kötelessége ugyanazon változás átvezetését kérni a **Mycostar gombaölő permetezőszer** engedélyokiratában is.

Az engedélyezési eljárás díja 250.000.- Ft.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet indíthat a Fővárosi Bírósághoz címezve, de az engedélyező hatóságnál előterjesztve jogszabálysértésre hivatkozással. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 16.500 Ft, a feleket a perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető.



INDOKOLÁS

Az ügyfél 2006. december 5. napján kelt kérelmében a **Bravo 500 gombaölő permetezőszerezrel** megegyező készítmény, a **Mycostar gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedély kiadását kérte az engedélyező hatóságtól.

Az ügyfél a kérelemhez mellékelte *a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az előzetes címketervet.*

Az engedélyezési eljárási díj megállapítása *a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklet A. részének 11.1 és 11.2 pontjai alapján történt.*

Az engedélyező hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy az ügyfél az engedély kiadásához szükséges dokumentumokat benyújtotta. Ezek alapján a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71-74. §-a, valamint a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 12-15. §-a, továbbá az ennek végrehajtására kiadott R. 7. §., valamint a 15-17. §-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.*

A címketerv bírálata a *Nvt. 23. § (2) és (3) bekezdése, valamint a R. 30. §-a alapján történt.*

Az engedélyező hatóság jelen határozatát a *Nvt. 11. § (1) bekezdése, illetve a R. 3. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében hozta.*

A jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, és illeték mértékéről, illetve az illetékfeljegyzési jogról a *Ket. 109.§ és 110.§ (1) bekezdése, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (3) bekezdése és a 62.§ (1)h) pontja alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.*

Budapest, 2007. február 23.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képvisellete
2. szakhatóság (OTH)
3. szakhatóság (OKTVF)
4. irattár

(20/2007.)

