

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Timac Agro Hungária Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) által képviselt Centre Mondial d'Innovation (35401 St Malo Cedex, Franklin Roosevelt Avenue 18. BP 80139, Franciaország)** ügyfélnek a **Fertiactyl Starter család** 6300/1016-1/2020 NÉBIH, 04.2/563-1/2017 NÉBIH, 04.2/125-3/2015 NÉBIH számú határozatokkal módosított, 04.2/681-3/2013 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Fertiactyl Starter család** 6300/1016-1/2020 NÉBIH, 04.2/563-1/2017 NÉBIH, 04.2/125-3/2015 NÉBIH számú határozatokkal módosított, 04.2/681-3/2013 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram :

Fertiactyl Radical: -

Fertiactyl Starter:



Fertiactyl Allegro:



6. 2. Figyelmeztetés:

Fertiactyl Radical: -

Fertiactyl Starter: Veszély

Fertiactyl Allegro: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

Fertiactyl Radical: nem jelölésköteles*

*címken nem feltüntetendő adat

Fertiactyl Starter:

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Fertiactyl Allegro

H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**Fertiactyl Radical**

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Fertiactyl Starter

P260	A permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező
P301 + P330 + P331	LENYELEÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310	Azonnal forduljon orvoshoz.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P363	A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P390	A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertiactyl Allegro

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P261	Kerülje a permet belélegzését.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310	Azonnal forduljon orvoshoz.
P333 + P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P501

A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor (lenyelés, bőrre kerülés, belélegzés, szembe kerülés esetén) a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

A *Fertiactyl Starter család* módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”


Budapest, 2021. április 21.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Képviselő
3. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/681-3/2013 NÉBIH

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYKIRAT**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Fertiactyl Starter*
Fertiactyl Allegro
Fertiactyl Radical

2. A készítmények típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: **TIMAC AGRO ESPAGNA SA**
31160 Orcoyen, Pol. Arazuri-Orcoyen, Calle C., Navarra
Spanyolország
statisztikai számjel: 31 007 644

Engedélyes: **Centre Mondial d'Innovation**
35401 St Malo Cedex, Franklin Roosevelt Avenue 18. BP 80139
Franciaország
statisztikai számjel: 402 947 014

Hazai képviselő: **Timac Agro Hungária Kft.**
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
statisztikai számjel: 13541985-4611-113-13"

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: EK műtrágyák, Fertiactyl biostimuláns (huminsavak, algakivonat, növényi kivonat), víz

Előírt minőségi feltételek

Fertiactyl Starter

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú, víznél viszkózusabb folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti anyagban)		11,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,26	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	35,0	
fulvosav tartalom (m/m%)	legalább	0,5	
N tartalom (m/m%)		13,0	± 1,1
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		8,0	± 0,4
Fertiactyl (huminsavak, algakivonat, növényi kivonat) tartalom (m/m%)		11,0	± 1,1

Fertiactyl Allegro

külem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú, víznél viszkózusabb folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti anyagban)		9,7	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,27	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	35,0	
N tartalom (m/m%)		11,0	± 1,1
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		8,0	± 0,4
Zn tartalom (m/m%)		1,0	± 0,2
Fertiactyl (huminsavak, algakivonat, növényi kivonat) tartalom (m/m%)		9,21	± 0,4

Fertiactyl Radical

külem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú, víznél viszkózusabb folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti anyagban)		8,6	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,31	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	62,0	
B tartalom (m/m%)	legalább	8,5	
Mn tartalom (m/m%)	legalább	0,25	
Fertiactyl (huminsavak, algakivonat, növényi kivonat) tartalom (m/m%)	legalább	5,0	

A termékcsalád minden tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:**Fertiactyl Starter**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a kezdeti fejlődés segítésére, az állományok megerősítésére, a stressztűrés növelésére és a regenerációs folyamatok gyorsítására szaktanácsadás szerint, ennek hiányában az alábbiak szerint:

- szántóföldi növényekben 3-8 l/ha mennyiségben, 150-500 l/ha vízmennyiséggel maximum 5 %-os töménységben, a kelés után 2-4 héttel kezdve 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve,
 - repcében 3 l/ha mennyiségben 150-500 l/ha vízmennyiséggel kelés után, majd 4-6 leveles fenofázisban kipermetezve,
 - kukoricában 7 l/ha mennyiségben 150-500 l/ha vízmennyiséggel kelés után, majd 2-4 leveles fenofázisban kipermetezve,
 - cukorrépában 5 l/ha mennyiségben 150-500 l/ha vízmennyiséggel kelés után, majd 4 leveles fenofázisban kipermetezve,

- burgonyában 8 l/ha mennyiségben 150-500 l/ha vízmennyiséggel kelés után, vagy 4 l/ha mennyiségben 90 %-os keléskor, majd 15 nap múlva kipermetezve,
- zöldségfélékben 5-10 l/ha mennyiségben, 150-500 l/ha vízmennyiséggel, maximum 6 %-os töménységben, a kelés után 2-4 héttel kezdve 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve, vagy tápoldatozva, illetve csöpögtető öntözéssel kijuttatva,
 - hüvelyesekben 5 l/ha mennyiségben, 150-500 l/ha vízmennyiséggel az 5 cm-es növényekre kipermetezve,
 - gyökérzöldségekben 10 l/ha mennyiségben, 150-500 l/ha vízmennyiséggel 3-4 leveles fenofázisban vagy 5 l/ha mennyiségben 3-4 leveles fenofázisban, majd 15 nap múlva kipermetezve,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben 5-10 l/ha mennyiségben, 150-500 l/ha vízmennyiséggel maximum 6 %-os töménységben, telepítéskor majd az ültetvények 5 éves koráig rügyfakadás után, évente 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve vagy tápoldatozva, illetve csöpögtető öntözéssel kijuttatva.

Fertiactyl Allegro

Szántóföldi növényekben a kezdeti fejlődés segítésére, az állományok megerősítésére, a stressztűrési növelésre és a regenerációs folyamatok gyorsítására 3-8 l/ha mennyiségben, 150-500 l/ha vízmennyiséggel, legfeljebb 5 %-os töménységben kipermetezve, a kelés után 2-4 héttel kezdve 1-2 alkalommal, 15 naponként kipermetezve, szaktanácsadás szerint, ennek hiányában az alábbiak szerint:

- repcében 3 l/ha mennyiségben 150-500 l/ha vízmennyiséggel kelés után, majd 4-6 leveles fenofázisban kipermetezve,
- kukoricában 7 l/ha mennyiségben 150-500 l/ha vízmennyiséggel kelés után, majd 2-4 leveles fenofázisban kipermetezve,
- cukorrépában 5 l/ha mennyiségben 150-500 l/ha vízmennyiséggel kelés után, majd 4 leveles fenofázisban kipermetezve,
- burgonyában 8 l/ha mennyiségben 150-500 l/ha vízmennyiséggel kelés után, vagy 4 l/ha mennyiségben 90 %-os keléskor, majd 15 nap múlva kipermetezve.

Fertiactyl Radical

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a kezdeti fejlődés segítésére, az állományok megerősítésére, a stressztűrési növelésre és a regenerációs folyamatok gyorsítására szaktanácsadás szerint, ennek hiányában az alábbiak szerint:

- szántóföldi növényekben 2-3 l/ha mennyiségben, 150-500 l/ha vízmennyiséggel a kelés után 2-4 héttel kezdve, 15 naponként kipermetezve,
 - cukorrépában 4 l/ha mennyiségben 500-1000 l/ha vízmennyiséggel legfeljebb 0,8 %-os töménységben, 6-10 leveles fenofázistól, 1-3 alkalommal kipermetezve,
- zöldségfélékben 3 l/ha mennyiségben, 500-1000 l/ha vízmennyiséggel, legfeljebb 0,6 %-os töménységben, virágzás előtt kezdve, 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve, vagy tápoldatozva, illetve csöpögtető öntözéssel kijuttatva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben 4 l/ha mennyiségben, 500-1000 l/ha vízmennyiséggel legfeljebb 0,8 %-os töménységben, virágzás előtt kezdve, évente 1-3 alkalommal, 15 naponként kipermetezve vagy tápoldatozva, illetve csöpögtető öntözéssel kijuttatva.

A termékcsalád minden tagjára vonatkozó előírások

Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!

Virágzásban méhkímélő technológiával, kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel.

Fagyveszély esetén nem használható, 25 °C-os hőmérséklet felett csak korán reggel vagy késő este lehet permetezni!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram :

Fertiactyl Radical: -



Fertiactyl Starter:



6. 2. Figyelmeztetés:

Fertiactyl Radical: -

Fertiactyl Starter: Veszély

Fertiactyl Allegro: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

Fertiactyl Radical: nem jelölésköteles*

*címkén nem feltüntetendő adat

Fertiactyl Starter:

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Fertiactyl Allegro

H315

Bőrirritáló hatású.

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

Fertiactyl Radical

P102

Gyermekektől elzárva tartandó.

P264

A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P270

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P302 + P352

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501

A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Fertiactyl Starter

P260

A permet belélegzése tilos.

P264

A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P270

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280

Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező

P301 + P330 + P331

LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310	Azonnal forduljon orvoshoz.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P363	A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P390	A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Fertiactyl Allegro

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P261	Kerülje a permet belélegzését.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310	Azonnal forduljon orvoshoz.
P333 + P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés, mérgezés esetén vagy annak gyanújakor (lenyelés, bőrre kerülés, belélegzés, szembe kerülés esetén) a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 10 literes műanyag (HDPE) kanna, 220 literes HDPE hordó, 1000 literes IBC tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, 0-40°C közötti hőmérsékletű, napfénytől védett, jól szellőző, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2023. július 25.

Budapest, 2021. április 21.

Jordán László
igazgató

P.H.