



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ELŐADÓ: Lázár Nelli
HATÁROZATSZÁM: 04.2/7026-1/2012.
OLDALAK SZÁMA: 4 oldal
MELLÉKLET: -

**TÁRGY: Galigan 240 EC gyomirtó
permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása**

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Makhteshim Agan Hungary Zrt.** (1037 Budapest, Montevideo u. 6.) által képviselt **Agan Chemical Manufacturers Ltd.,** (Izrael) ügyfélnek hivatalból indult eljárásra a **Galigan 240 EC gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az Engedélyező hatóság a **Galigan 240 EC gyomirtó permetezőszer 11518/2002. FVM** számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
		szer (l/ha)	víz (l/ha) mennyisége	
napraforgó	magról kelő kétszikű gyomnövények	0,8-1,0	200-250	vetés után, kelés előtt (BBCH 0)
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) (3 évesnél idősebb)	magról kelő kétszikű gyomnövények	1,0	250-300	a magról kelő gyomnövények 2-4 leveles (BBCH 12-14) állapota
őszi- és kajsziarack, cseresznye, meggy (3 évesnél idősebb)	magról kelő kétszikű gyomnövények	1,0	250-300	a magról kelő gyomnövények 2-4 leveles (BBCH 12-14) állapota
szőlő (borszőlő, csemegeszőlő) (3 évesnél idősebb)	magról kelő kétszikű gyomnövények	1,0	250-300	a magról kelő gyomnövények 2-4 leveles (BBCH 12-14) állapota
vasúti pályatestek	magról kelő kétszikű gyomnövények	1,0	250-300	fenológiai megjelölés nélkül
vöröshagyma	magról kelő kétszikű gyomnövények	0,7-0,8	250-300	három-négy leveles állapot (BBCH 13-14)

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Napraforgóban a készítményt a kultúrnövény vetése után kelése előtt, preemergensen kell kijuttatni. A jó gyomirtó hatás érdekében fontos a jól elmunkált, egyenletes, aprómorzsás talajfelszín. A magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatásának kiegészítésére a napraforgóban engedélyezett ilyen hatásspektrumú készítményekkel kombinálható, azok engedélyokiratukban meghatározott dózisban és technológiával.

A 2-4 leveles napraforgóban a hirtelen lehulló csapadék a készítményt a talajról felferheti, ami levélperzselésben megnyilvánuló, átmeneti fitotoxicitást okozhat. A napraforgó ezt a hatást maradéktalanul kinövi.

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya), őszi- és kajsziarack, cseresznye, meggy valamint szőlő (borszőlő, csemegeszőlő) kultúrákban, melyek 3 évesnél idősebbek, sávos sorpermetezéssel alkalmazható. Önmagában alkalmazva a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony. A kijuttatás optimális időpontja a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában van. Egyszikű gyomnövények, valamint évelők ellen glifozát hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisével kombinációban célszerű alkalmazni.

A kijuttatás optimális időpontja a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles, évelők esetében azok intenzív növekedési szakaszában van. *A permetezés során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény leveleire, hajtásaira, a fiatal ágakra ne kerüljön, mert azokat károsíthatja.*

Vasúti pályatestek gyomirtására *glifozát hatóanyagú készítménnyel kombinációban kell alkalmazni, önmagában kijuttatva nem ad kellő hatékonyságot.*

Vöröshagymában a készítményt posztemergensen, legkorábban a hagyma 3-4 leveles állapotában lehet kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotukban a legérzékenyebbek a készítményre. Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, úgy, hogy a hagyma levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. *Csak ép, egészséges levélzetű hagymát szabad kezelni, 25°C feletti hőmérsékleten tilos a készítmény kijuttatása.* A kezelést követően fellépő esetleges depressziót a hagyma károsodás nélkül kiheveri. ***A permetléhez nedvesítőszer hozzáadása és más növényvédő szerrel való keverése tilos!***

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímekét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Törvényszéktől** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2012. december 18.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Irattár.

(384/2012.)