A szúnyog vektorok elleni védekezésben felhasználható biocid termékek

l

Legutóbbi módosítás: 2025.09.25.

ÉLŐÁLLATOK KEZELÉSÉRE ALKALMAZHATÓ KÉSZÍTMÉNYEK (Gyógyszerek- ÁTI)

Név/ hatóanyag	Tkvi szám	Célállat	Kiszerelés	Figyelmeztetés	É.E.V.I.	Alkalmazás - adagolás
Neocidol 600 EC/diazinon Permetezés (istállóra), fürösztés (Új név: Neocidol 600 mg/ml koncentrátum fürösztő emulzióhoz juhok részére A.U.V.)	2876/1-3/11 MgSzH ÁTI. 2876/1-2/11 MgSzH ÁTI	juh	1 liter 5 liter	Tűzveszélyes! Mérgező! Antidótum: atropin Lovak, és nyulak, madarak, baromfi és macska nem kezelhető! 3 hétnél fiatalabb bárányok nem kezelhetők! Vemhes állat nem kezelhető! Szűk a terápiás sáv!! Fürösztés előtt meg kell az állatokat itatni, de nem szabad etetni.	juh: 70 nap. Tejtermelő juh nem kezelhető!	Juh fürösztés: induló töménység: 250 ppm (10 ml Neocidol 24 liter vízbe) pótlás: 750 ppm (1250 ml Neocidol 1000 liter vízbe) Istállókezelés: 5 liter permetlé/100 m^2-re: 2,5% (200 ml Neocidol 5 liter vízbe)
Novacidol 600 mg/ml koncentrátum fürösztő emulzióhoz A.U.V. / diazinon	2669/1-3/10 MgSzH ÁTI	juh	5 ml 1 liter 5 liter	Nem alkalmazható hígítás nélkül. Ne kezeljünk beteg, gyenge, kimerült és szomjas állatokat! Nem alkalmazható három hetesnél fiatalabb bárányok kezelésére. A készítménnyel tejtermelő juh, macska, madár, baromfi, hal és méh nem kezelhető. Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.	Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 28 nap **A készítményalkalmazása emberi fogyasztásra tejet termelő juhok kezelésére nem engedélyezett.**	Juhok merülő fürösztéséhez 250 mg/l diazinon tartalmú induló töménységű emulziót kell alkalmazni: 425 ml Novacidol 600 mg/ml koncentrátum fürösztő emulzióhoz juhok részére A.U.V.-t adunk 1000 liter csapvízhez. A fürösztő emulziót a felhasználás előtt kell elkészíteni, a hígításhoz csapvizet használjunk. Folyamatos keverés

						szükséges a hatóanyag egyenletes eloszlatása céljából. Az elkészített emulziót 24 órán belül fel kell használni!
Unomec 5 mg/ml ráöntő oldat hús- és tejhasznú szarvasmarhák részére A.U.V. / eprinomektin	3820/1-4/16 Nébih ÁTI	szarvasmarha (hús és tejelő)	1 liter 2,5 liter 3 liter 5 liter	A készítmény csak helyileg alkalmazható húsmarháknál és tejhasznú teheneknél, beleértve a laktáló teheneket is. Más állatfajokban alkalmazása tilos. Szájon át vagy injekcióként alkalmazása tilos. Nem alkalmazható a hatóanyaggal, vagy bármely segédanyaggal szembeni ismert túlérzékenység esetén.	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap. Tej: nulla óra	Ráöntő (pour-on) alkalmazás. A készítmény csak helyileg alkalmazható 1 ml / 10 ttkg adagban, ami megfelel 0,5 mg eprinomektin / ttkg dózisnak. A készítményt a gerinc mentén a martól a faroktőig terjedő vékony sávban kell alkalmazni.

Név/ hatóanyag	Tkvi szám	Célállat	Kiszerelés	Figyelmeztetés	É.E.V.I.	Alkalmazás - adagolás
VETo-ZINON-60 koncentrátum fürösztő emulzióhoz/diazinon Fürösztésre (Új név: VETo-ZINON 600 mg/ml koncentrátum fürösztő emulzióhoz juhok részére A.U.V.)	3176/1-2/14. 3176/1-3/12 Nébih ÁTI	juh	5x5 ml ampullába 1 liter, 5 liter	Tűzveszélyes! Gyúlékony! Mérgező! Antidótum: atropin Lovak, és nyulak, madarak, baromfi és macska, hal, méh nem kezelhető! 3 hétnél fiatalabb bárányok nem kezelhetők! Fürösztés előtt itatni kell. Vemhesnek nem adható.	Juh: 28 nap. Tejtermelő juh nem kezelhető!	425 ml VETo-ZINON oldat+1000 liter víz pótlás: 1250 ml VETo-Zinon 1000 ml vízhez
Eprizero 5 mg/ml ráöntő oldat tejelő tehenek és húsmarhák	3327/1-5/13 Nébih ÁTI	szarvasmarha	250 ml 1 liter 2,5 liter 5 liter	Csak szarvasmarhának adható. Csak ép bőrön alkalmazható!	Szarvasmarha hús és egyéb ehető szövetek: 10 nap Tej: nulla nap.	Kizárólag külsőlegesen alkalmazható 1 ml / 10 testtömeg kg adagban, amely

részére A.U.V./eprinomektin				Nagyon toxikus a trágya élővilágára és a vízi szervezetekre, valamint felhalmozódhat az üledékben.		megfelel 0,5 mg / testtömeg kg eprinomektinnek. A terméket külsőleg kell alkalmazni a hát középvonala mentén a martól a faroktőig keskeny csíkban öntve.
Deltanil 10 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarhák és juhok részére/deltametrin	3445/1-5/13 Nébih ÁTI	szarvasmarha juh	500 ml 1 liter 2,5 liter 4,5 liter	Beteg állatokon nem alkalmazható. A keszítmény ne kerüljön szembe és nyálkahártyákra.	Szarvasmarha: hús és egyéb ehető szövetek: 17 nap Tej: nulla óra. Juh: hús és egyéb ehető szövetek: 35 nap. juhtej: nulla óra.	Szm: 10 ml készítmény/állat. Juh: 5 ml készítmény/állat Bárány (10 kg-ig, vagy 1 hónapos korig): 2,5 ml készítmény/állat. A hát középvonalában a váll magasságában kell a készítményt az állatokra önteni.
Neoprinil pour on 5 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarhák részére A.U.V./eprinomektin	3488/1-6/13 Nébih ÁTI	szarvasmarha.	1 liter 2,5 liter 4,5 liter 5 liter 8 liter	Más állatfajon alkalmazni tilos! Csak egészséges bőrfelületen alkalmazható. Az eprinomektin nagyon toxikus a trágya élővilágára és a vízi szervezetekre, és felhalmozódhat az üledékben. Az eprinomektin a talajban perzisztál.	Szarvasmarha hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap Tej: nulla óra.	Külsőlegesen alkalmazandó egyszeri 500 µg eprinomektin/ttkg dózisban, ami megfelel 1 ml Neoprinil pour on/ 10 ttkg-nak. A készítményt keskeny csíkban öntve, a hát középvonala mentén, a martól a faroktőig kell alkalmazni.
Spotinor 10 mg/ml rácsepegtető oldat szarvasmarhák és juhok részére/deltametrin	3575/1-5/14 Nébih ÁTI	szarvasmarha, juh	250 ml 500 ml 1 liter 2,5 liter	Beteg vagy legyengült állaton nem alkalmazható.	Szarvasmarha: hús és egyéb ehető szövetek: 17 nap. Tej: nulla óra. Juh: hús és egyéb ehető szövetek: 35 nap.	Szarvasmarha: 100 mg deltametrin / állat, ami 10 ml készítménynek felel meg. Juh: 50 mg deltametrin / állat, ami 5 ml készítménynek felel meg. Bárány (10 ttkg vagy 1 hónapos kor alatt): 25 mg deltametrin / állat, ami 2,5 ml készítménynek felel meg. Egy helyre a hát középvonalában a vállak magasságábn ráönteni A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet

						termelő juhoknál nem engedélyezett.
Dertyl 10 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarhák és juhok részére A.U.V. deltamethrin	4086/1-3/2019 Nébih ÁTI	szarvasmarha ,juh	350 ml 1000 ml 5000 ml	Nem alkalmazható lábadozó vagy beteg állatoknál. Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. A készítmény off-label alkalmazása nem célállatfajokon – kutyán és macskán – toxikus	Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 17 nap Tej: Nulla óra Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 35 nap Tej: A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő juhoknál nem engedélyezett	Szarvasmarha: 100 mg deltametrin / állat, ami 10 ml készítménynek felel meg Juh: 50 mg deltametrin / állat, ami 5 ml készítménynek felel meg Bárány: (10 ttkg vagy 1 hónapos kor alatt): 25 mg deltametrin / állat, ami 2,5 ml készítménynek felel meg
Elivec 5 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarhák számára A.U.V. (Eprinex generikum)	3950/1/18 Nébih ÁTI (1 l) 3950/2/18 Nébih ÁTI (2,5 l) 3950/3/18 Nébih ÁTI (5 l)	szarvasmarha (hús,tej)	1 l, 2,5 l, 5l	atka, tetű, bökőlégy	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap. Tej: nulla óra.	A készítmény csak helyileg alkalmazható 1 ml / 10 ttkg adagban, ami megfelel 500 µg eprinomektin / ttkg dózisnak. A készítményt a gerinc mentén a martól a faroktőig terjedő vékony sávban kell alkalmazni.
Topimec 5 mg/ml ráöntő oldat A.U.V. ivermektin	4133/1-7/20 Nébih ÁTI	szarvasmarha (hús, nem laktáló)	250ml, 1 l, 2,5 l, 5 l, 6 l	Nem alkalmazható a hatóanyaggal szembeni ismert túlérzékenység esetén. A készítményt kifejezetten szarvasmarhák helyi kezelésére fejlesztették ki. Más fajoknak nem adható, mert súlyos mellékhatásokat, kutyában akár elhullást is okozhat.	Hús és egyéb ehető szövetek: 28 nap. Tej: A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő tejelő tehenekben nem engedélyezett. A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő szarvasmarhában és tejelő tehenekben az	Adagja: 1 ml/10 ttkg (alapul véve az 500 mikrogramm ivermektin/kg ajánlott dózist). A megfelelő adagolás biztosítása érdekében az állatok testtömegét a lehető legpontosabban kell meghatározni.

					ellést 60 nappal megelőzően nem engedélyezett.	
Dorimec 5 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarháknak - doramektin	4334/1/22 Nébih ÁTI 4334/2/22 Nébih ÁTI 4334/3/22 Nébih ÁTI 4334/4/22 Nébih ÁTI 4334/5/22 Nébih ÁTI 4334/6/22 Nébih ÁTI	szarvasmarha	1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l, 6 l, 8 l	A készítményt kifejezetten szarvasmarháknak, helyi alkalmazásra fejlesztették ki. Nem adható más állatfajoknak, mivel súlyos mellékhatások fordulhatnak elő, kutyák esetében akár elhullás is. Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.	Hús és egyéb ehető szövetek: 35 nap. A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett. Nem alkalmazható a várható ellés előtti 2 hónapon belül azoknál a vemhes teheneknél vagy üszőknél, amelyek emberi fogyasztásra szánt tejet fognak termelni.	Egyszeri kezelés 1 ml készítmény (5 mg doramektin)/10 testtömegkilogramm , ami 500 µg/testtömegkilogrammnak felel meg, külsőleg alkalmazva a hát középvonala mentén, a mar és a faroktő közötti keskeny sávban.
Eprinex Multi 5 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarhák, juhok és kecskék részére eprinomektin	3987/1/18 Nébih ÁTI 3987/2/18 Nébih ÁTI 3987/3/18 Nébih ÁTI 3987/4/18 Nébih ÁTI	szarvasmarha, juh, kecske	250 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l	Nem alkalmazható más állatfajokon. Az avermektinek elhullást okozhatnak kutyákban, különösen a skót juhászkutyákban, az óangol juhászkutyákban és rokon fajtáikban és keverékeikben, és a vízi- és szárazföldi teknősökben is. Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.	Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap. Tej: nulla óra. Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 2 nap. Tej: nulla óra. Kecske: Hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap. Tej: nulla óra.	A készítményt külsőleg, a hát középvonala mentén, a martól a faroktőig, keskeny csíkban kell ráönteni. Szarvasmarha: Külsőleg alkalmazva 0,5 mg eprinomektin/ttkg, ami megfelel a javasolt 1 ml/10 ttkg adagnak. Juh és kecske: Külsőleg alkalmazva 1,0 mg eprinomektin/ttkg, ami megfelel a javasolt 2 ml/10 ttkg adagnak. A hát középvonala mentén, hajtsa szét a gyapjat/ a szőrzetet és helyezze az adagolót, vagy a flakon nyílását a bőrfelületre.

NYITOTT ÁLLATSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK KEZELÉSE / FELÜLETKEZELÉS PERMETEZÉSSEL (a rejtett életmódú rovarokhoz hasonlóan)

Super Champion H rovarirtó permet	0,15 % permetrin	III.kat. /Agria-Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 3300 Eger Lőcsei ú. 14. T: 36-516-021.	5 és 10 literes kannás kiszerelés, hígítatlanul kipermetezni kártevőként csak Rejtett életmódú rovarok vannak említve http://www.oek.hu/ika/pdf/superchampionhrovarirtopermet05.pdf	permetező géppel kijuttatva
PESTSTOP® PERM 25 CS rovarirtó koncentrátum	23,6% permetrin	Bábolna	http://www.oek.hu/ika/pdf/peststopperm25csrovarirtokoncentratum12.pdf	
BOMBEX λ PLUS rovarirtó koncentrátum	9,8% lambda-cihalotrin + 5,0% permetrin	Chemtura	http://www.oek.hu/ika/pdf/bombexlambdaplusrovarirtokoncentratum13.pdf	

Szúnyoglárva irtására alkalmas készítmények:

BIOPREN-BM 5 GR szúnyoglárva-irtó granulátum	5% S-metoprén	III. kat. Bábolna	http://www.oek.hu/ika/pdf/bioprenbm5grszunyoglarvairtogranulatum06.pdf
PROTECT® 4 GR szúnyoglárva-irtó granulátum	0,4% S-metoprén	III. kat. Bábolna	http://www.oek.hu/ika/pdf/biopren4grszunyogeslegylarvairtogranulatum12.pdf
PROTECT® szúnyoglárva-irtó granulátum	1,5% S-metoprén	III. kat. Bábolna	http://www.oek.hu/ika/pdf/protectszunyoglarvairtogranulatum12.pdf
VECTOBAC 12 AS szúnyoglárva-irtó szer	1200 ITU/mg Bacillus thuringiensis var. israelensis	III. kat. Bábolna	http://www.oek.hu/ika/pdf/vectobac12asszunyoglarvairtoszer07.pdf
VECTOBAC G szúnyoglárva-irtó granulátum	200 ITU/mg Bacillus thuringiensis var. israelensis	III. kat. Bábolna	http://www.oek.hu/ika/pdf/vectobacgszunyoglarvairtogranulatum07.pdf

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KEZELÉSE ULV ELJÁRÁSSAL

(Lényegében az eljárás megegyezik a hidegköd-képzéssel, azonban itt 5-20 mikrométer közötti csepp átmérőjű szemcséket juttatunk ki a felületre ULV-berendezéssel.)

Név	Hatóanyag	Forgalmazási kategória/ forgalmazó	Munkaoldat elkészítése készítmény +oldószer	Kijuttatási mennyiség/kijuttatás járművel
Deltasect 1,2 ULV szúnyogirtó szer	1,2 gramm deltametrin/liter + 1,2 gramm piperonil-butoxid/liter	III.kat. Sharda Hungary Kft. 1095 Budapest, Mester u. 28. I/5.	hígítás nélkül http://www.oek.hu/ika/pdf/deltasect1,2ullvszunyogirtoszer.pdf	Szabadban, légi úton ULV eljárással, valamint földi útn, megfelelő járműről ULV-eljárással, illetve melegköd-képzéssel kijuttatva.
Mosquitox 1 ULV Forte szúnyogirtó szer	0,12 % deltametrin + 0,6 % piperonil-butoxid	III.kat. Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107. Bp. Szállás u. 6. T: 1-432-400	hígítás nélkül http://www.oek.hu/ika/pdf/mosquitox1ulvforteszunyogirtoszer13.pdf	0,5-0,8 liter/hektár légi vagy földi járművön elhelyezett ULV szórófejjel
Coratrin szúnyogírtó szer	1,2 gramm deltametrin/liter + 1,2 gramm piperonil-butoxid/liter	III. kat. Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt., 1119 Budapest, Etele út 57.	hígítás nélkül http://www.oek.hu/ika/pdf/coratrinszunyogirtoszer14.pdf	Szabadban, légi úton ULV eljárással, valamint földi úton, megfelelő járműről ULV-eljárással, illetve melegköd-képzéssel kijuttatva
Mosquitox Fog melegköd-képző szer	0,12% deltametrin + 0,6 % piperonil-butoxid	III.kat. Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107. Bp. Szállás u. 6. T: 1-432-400	hígítás nélkül http://www.oek.hu/ika/pdf/mosquitoxfogmelegkodkepzoszer13.pdf	Szabadban, földi úton, megfelelő járműről melegköd-képzéssel kijuttatva
Mosquitox – Lambda 1 ULV szúnyogirtó szer	0,12 % lambda-cihalotrin + 0,6 % piperonil-butoxid	III.kat. Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107. Bp. Szállás u. 6. T: 1-432-400	hígítás nélkül http://www.oek.hu/ika/pdf/mosquitoxlambda1ulvszunyogirtoszer131.pdf	Szabadban, ULV eljárással, földi vagy légi járműről kijuttatva.

*= sűrűség (15 ^{o}C-on): 840-970 kg/m^3, viszkozitás (15 ^{o}C-on): 14-17 mm^2/s, lobbanáspont: 180-210 ^{o}C, policiklikus aromás tartalom:<1 %.