



Szemcsés hátú csillagoscincér  
*Anoplophora chinensis*

Simahátú csillagoscincér  
*Anoplophora glabripennis*



A karantén károsítók gazdanövényei:  
számos lombhullató fás növény, f ként:




A lárvá  
rágcsáléka  
f részpor  
jelleg .



A szemcsés hátú cincérnél a röpnyílások a törzs alsó részén és a gyökereken találhatók.

A „f részpor” a fától távolabb is megtalálható, ha a lárvák a földfelszín közeli gyökerekben táplálkoznak.



A simahátú cincérnél a röpnyílások a törzs középs részét l felfelé találhatók. Az összes többi tünet hasonló a szemcsés hátú cincé- réhez.

A cincér által megrágott kéreg



friss és beforrt rágásnyom



A szemcsés hátú csillagos-  
cincér 4-5 cm-es lárvái a fa  
pusztulását okozzák.



Ez a cincérfaj facsoma-  
golóanyagokkal kerülhet  
be az országba.



A szemcsés hátú csillagos-  
cincér ültetési anyagokkal  
kerülhet be az országba  
(f ként juhar oltványokkal).



**FIGYELEM!**

Összetéveszthet :  
Ezen a platánfán (gazdanövényen) észlelt,  
14-18 mm-es röpnyílások  
nem a csillagoscincér kártételei,  
hanem a nagy farontóé!

