



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Ügyintéző:** dr. Szabóné K. Gabriella, dr. Kelemen Mária

**Határozatszám:** 04.2/2648-1/2014

**Oldalak száma:** 6 oldal

**Melléklet:** -

**TÁRGY:** Champ DP gombaölő  
permetezőszert forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a Nufarm Hungária Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) által képviselt Nufarm GmbH & Co. KG. (St. Peter Str. 25, A-4120 Linz, Ausztria) ügyfél részére a **Champ DP gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában, hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a **Champ DP gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező **FVM 15672/2003** számú határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

#### I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

##### 4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis (kg/ha) Koncentráció (%)	Permetlé (l/ha)	A kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva)
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	őszi- és tavaszi lemosó permetezés (baktériumos-, gombás ágelhalások) tűzelhalás	4	7	3,0-4,0	800-1500	2 héttel betakarítás előtti állapot – BBCH 84
	varasodás			2,0-3,0		
csonthéjasok (kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva) (piros-, fehérbimbós állapotig ill. lombhulláskor)	baktériumos-, gombás ágelhalások, levéllyukacsosodás, tafrina, apiognomónia	4	7	2,0-3,0	800-1500	3 héttel betakarítás előtti állapot – BBCH 83

<b>bogyóstermésűek</b> (ribiszke, málna, köszméte, szamóca, szeder, szeder málna, fekete bodza)	őszi- és tavaszi lemosó permetezés, levél- és vesszőbetegségek	4	10	3,0	500-800	3 héttel betakarítás előtti állapot – BBCH 83
<b>héjas gyümölcsűek</b> (dió, mandula, mogyoró, gesztenye)	baktériumos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat)	3	10	2,0-3,0	800-1200	3 héttel betakarítás előtti állapot – BBCH 83
<b>szőlő</b>	peronoszpóra, orbánc	4	7	2,0	600-1000	Fürtzáródás vége – BBCH 79
<b>paprika, paradicsom</b> (szabadföldi)	baktériumos betegségek, alternária, paradicsomvész	4	10	2,0	400-800	50%-os érés – BBCH 85
(hajtatott)				0,2%	600-1500	
<b>kabakosok</b> uborka (konzerv) szabadföldi	baktériumos betegségek, peronoszpóra	4	10	2,0	400-800	Betakarítás előtt 5 nappal
hajtatott				0,2%	600-2000	Betakarítás előtt 3 nappal
<b>hüvelyesek</b> (bab, borsó, lóbab, lencse, csicseriborsó)	baktériumos betegségek, aszkohita, fenésedés, peronoszpóra, rozsdabetegségek	4	10	2,0	400-600	Érés kezdete – BBCH 81
<b>hagyma</b>	baktériumos betegségek, peronoszpóra	4	10	2,0	400-600	Dőlés kezdete – BBCH 47
<b>burgonya</b>	burgonyavész, alternária	4	7	2,0	400-600	Bogyófejlődés – BBCH75
<b>cukorrépa</b>	cerkospórás, fómás, ramuláriás levélfoltosság	4	7	2,0	400-600	50%-os gyökérnagyság – BBCH 45

<b>gyógy-, aroma- és fűszernövények</b> (macskagyökér, koriander, angelika, borsmenta, citromfű, kamilla, kapor, konyhakömény, édeskömény, ánizs, szurokfű, borsfű, izsóp, sáfrányos szeklice, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, zamatos turbolya, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, lestyán, majoranna, tárkony, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vassfű, lósóska, orvosi zsálya, fehérmályva, articsóka, keskenylevelű útifű, mórmályva)	baktériumos betegségek, peronoszpóra, alternáriás-, szeptóriás-, fómás betegség	2	14	2,0	250-500	betakarítás előtt 21 nappal
<b>közterületi díszfák és díszcserjék</b>	baktériumos- és gombás betegségek (kivéve lisztharmat)	3	10	0,2%	600-1500	nincs korlátozás

Házikerti felhasználás: 30-40 gramm készítmény / 10 l víz

### Előírt növényvédelmi technológia:

**Almatermésűekben** a készítményt baktériumos- és gombás eredetű ágelhalások ellen tavaszi és őszi lemosó permetezéssel javasolt kijuttatni. A tűzelhalás és varasodás ellen megelőző jelleggel, rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig, 2-3 alkalommal lehet védekezni. A kezeléseket 7-10 napos gyakorisággal, nagy permetlé mennyiséggel célszerű végezni. A termés viaszosodását követően a készítmény záró permetezésre újból használható a rézérzékenység, a perzselési veszély figyelembe vételével. A faiskolai alany-, csemete- és oltványkertekben a tűzelhalás elleni védekezéseket a fertőzési időszak előtt kell megkezdeni. A fertőzési helyzet ismeretében a permetezéseket 10-14 naponként, 2-3 alkalommal, 300-400 l/ha permetlé felhasználásával ajánlott elvégezni.

**Őszi- és kajsziarackban** baktériumos- és gombás eredetű ágelhalások, levéllyukacsosodás, valamint ősziarackban tafrinás levélfodrosodás és kajsziarackban apiognomóniás levélfoltosság ellen legfeljebb **pirosbimbós állapotig** lehet védekezni a rézérzékenységből fakadó perzselési veszély nélkül. Ősszel, a lombhullás kezdetén a baktériumos és gombás eredetű ágelhalások ellen a kezelés ismét indokolt.

**Szilvában, meggyben és cseresznyében** levéllyukacsosodás és ágelhalások ellen folyamatosan, a fertőzés alakulása szerint lehet permetezni.

**Bogyósokban** a vegetációs időszak elején és a termés betakarítása után a vessző- és levélfoltosságok ellen javasolt a készítmény lemosásszerű alkalmazása.

**Héjas gyümölcsűekben** a baktériumos és gombás eredetű betegségek (kivéve lisztharmat) ellen a védekezést az első tünetek megjelenésekor szükséges megkezdeni, és a kezelést a fertőzés erősségétől függően, 10-14 naponta ajánlott megismételni.

**Szőlőben** peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva kell védekezni. A permetezést általában a hajtások 20-25 cm-es állapotában javasolt megkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint, 7-10 naponként célszerű megismételni. A fűrtzáródás utáni kezelések kedvezően befolyásolják a szürkepenész elleni védekezések eredményességét is. Orbánc ellen a készítményt – amennyiben a kezdeti fertőzések kialakultak – 3-4 leveles állapottól, a továbbiakban pedig a peronoszpóra elleni kezelésekkel egybekötve ajánlott kijuttatni.

**Szabadföldi és hajatott zöldségfélékben** a baktériumos és gombás eredetű betegségek (kivéve lisztharmat) ellen a kezeléseket az előrejelzésre alapozva, preventíven kell megkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint, 2-3 alkalommal, 10-14 naponként javasolt megismételni. Hagymában és borsóban a permetlé megfelelő tapadása érdekében nedvesítő szer használata indokolt.

A permetlé mennyiségét a védendő növényfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.

**Burgonyában** a permetezéseket lehetőleg előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdeni, majd a fertőzés alakulásától függően 7-12 naponként indokolt megismételni.

**Cukorrépában** előforduló levélbetegségek (a lisztharmat kivételével) ellen megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek észlelésekor javasolt elkezdni a védekezést. Az időjárási körülmények, ill. járványhelyzet alakulásától függően 7-10 naponként célszerű megismételni a permetezést.

**Gyógy- aroma-, és fűszernövényekben** (macskagyökér, koriander, angelika, borsmenta, citromfű, kamilla, kapor, konyhakömény, édeskömény, ánizs, szurokfű, borsfű, izsóp, safrányos szeklice, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, zamatos turbolya, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, lestyán, majoranna, tárkony, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vassfű, lósóska, orvosi zsálya, fehérmályva, articsóka, keskenylevelű útifű, mórnyálva) baktériumos betegségek valamint peronoszpóra, alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a készítményt megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni. A permetezések előtt a fitotoxicitás elkerülése érdekében próbapermetezés elvégzése indokolt!

**Közterületi díszfák, díszcserjék** baktériumos- és gombás betegségei (kivéve lisztharmat) ellen a készítményt az előzetes rézérzékenység megállapítása után 0,2 %-os töménységben (20 g / 10 l víz) használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elkezdni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni.

A permetezések előtt a fitotoxicitás elkerülése érdekében próbapermetezés elvégzése indokolt!

**A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.**

**A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni.**

A közterületeken történő felhasználáskor a kezeléssel az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!

## **2. Légi kijuttatás: -**

**II. Az engedélyokirat 5. pontjának az „Élelmezés-egészségügyi várakozási idő”-re vonatkozó előírásai az alábbiak szerint módosulnak:**

**Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:**

<b>almatermésűek</b>	<b>10 nap</b>
<b>csonthéjasok</b>	<b>21 nap</b>
<b>bogyótermésűek</b>	<b>21 nap</b>
<b>héjas gyümölcsűek</b>	<b>21 nap</b>
<b>szőlő</b>	<b>21 nap</b>
<b>paprika, paradicsom, burgonya</b>	<b>7 nap</b>
<b>uborka</b>	<b>5 nap</b>
<b>hüvelyesek</b>	<b>5 nap</b>
<b>uborka (konzervipari)</b>	<b>3 nap</b>
<b>hagyma</b>	<b>21 nap</b>
<b>cukorrépa</b>	<b>21 nap</b>
<b>közterületi díszfák, díszcserjék</b>	előírás szerű felhasználás esetén nem szükséges
<b>gyógy-, aroma- és fűszernövényeken</b>	<b>14 nap</b>

**III. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**9. Eltarthatóság:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.  
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **3 év**.

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

A megváltozott termék címkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2014. május 6.

Dr. Oravecz Márton  
elnök  
nevében és megbízásából:

Jordán László  
igazgató

*P.H.*

**Kapja:**

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irrattár

(160/2014)