



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 309-1000; Fax: 1/246-2960,

Ikt.sz.: 04.2/ 2387-2/2011.
Tárgy: **Alert S, Alert Solo, Harvesan, Charisma**
gombaölő permetezőszerek és **Pointer Star, Granstar Super 50 SX, Granstar SuperStar** gyomirtó szerek eseti felhasználási engedélye kalászosokban, napraforgóban légi alkalmazásra
(DuPont Magyarország Kft.)
Ügyintéző: Baranyi Tibor
Melléletek: 1-2. számú melléklet

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a DuPont Magyarország Kft (2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.) kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

A **DuPont Magyarország Kft.** kérelmére a hazai gabonatermelők részére 2011. július 30-ig

engedélyezi

az **Alert S** gombaölő permetezőszer 45.821/1999. FVM számú, a **Harvesan** gombaölő permetezőszer 15.338/2003. FVM számú, az **Alert Solo** gombaölő permetezőszer 2.5/1318/1/2007. MgSZHK számú és a **Charisma** gombaölő permetezőszer 35.013/2001. FVM számú és a **Pointer Star** ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer 02.5/3602/3/2007. MgSZHK számú, a **GranstarSuperStar** gyomirtó permetezőszer 02.5/176/1/2010. MgSZHK számú és a **GranstarSuper 50 SX** gyomirtó permetezőszer 02.5/7/1/2008. MgSZHK számú engedélyokiratban foglaltaktól eltérő felhasználását eseti jelleggel, 129.000 ha kalászos kultúrákban (1-2. számú melléklet) lisztharmat, pirenofórás, szeptóriás betegségek, rozsdabetegségek, kalász fuzáriózis, *Alert Solo* esetében napraforgóban szár és tányérbetegségek és kalászos gyomirtó szerek esetében magról kelő egy- és kétszikű és évelő gyomok ellen **légi kijuttatással**.

A ügyfél és felhasználói körének a felelősségére:

- az **Alert S** gombaölő permetezőszer felhasználható *kalászosokban (búza, árpa, őszi, tavaszi)* szár és levéltbetegségek és kalászfuzáriózis ellen maximum 1,0 l/ha dózisban. A korai védekezés javasolt ideje a szárbaindulás állapota, ekkor elsősorban a szártőbetegségek, továbbá a korai lisztharmat, szeptóriás és pirenofórás betegség ellen irányul a védekezés. A második permetezési időszak a kalászhányás végén -

virágzás kezdetén kalászfuzárium ellen. A védekezés célja ekkor a felső levélemeletek és a kalász védelme kalászfuzárium, illetve szeptóriás és pirenofóras levélbetegségek, valamint a rozsdabetegségek ellen.

- a **Harvesan** gombaölő permetezőszer felhasználható *kalászosokban (búza, árpa)* szár és levélbetegségek és kalászfuzáriózis ellen maximum kettő alkalommal 0,8 -1,0 l/ha dózisban. A kalászkok védelmére irányuló kezelések ideje kalászhányás végén - virágzás kezdetén kalászfuzárium ellen. A védekezés célja ekkor a felső levélemeletek és a kalász védelme kalászfuzárium, illetve szeptóriás és pirenofóras levélbetegségek, valamint a rozsdabetegségek ellen.
- az **Alert Solo** gombaölő permetezőszer felhasználható *kalászosokban (búza, árpa, tritikálé)* szár és levélbetegségek ellen maximum kettő alkalommal 0,8 -1,0 l/ha dózisban. A kalászfuzáriózisra érzékenyebb gabona fajtáknál az *Alert S* és *Harvesan* gombaölő készítmények felhasználása javasolt. A második permetezési időszak a kalászhányás végén - virágzás kezdetén kalászfuzárium ellen javasolt elvégezni. A védekezés célja ekkor a felső levélemeletek és a kalász védelme kalászfuzárium, illetve szeptóriás és pirenofóras levélbetegségek, valamint a rozsdabetegségek ellen. *Napraforgóban* felhasználható szár és tányérbetegségek ellen csillagbimbós és citromérési időszakban önmagában 0,8 l/ha dózisban vagy *Tanos* kombinációban 0,5-0,8 l/ha dózisban.
- a **Charisma** gombaölő permetezőszer felhasználható *kalászosokban (búza, árpa, tritikálé)* szár és levélbetegségek ellen maximum kettő alkalommal 1,0-1,5 l/ha l/ha dózisban. A kalszfuzáriózisra érzékenyebb gabona fajtáknál az *Alert S* és *Harvesan* gombaölő készítmények felhasználása javasolt. A második permetezési időszak a kalászhányás végén - virágzás kezdetén kalászfuzárium ellen. A védekezés célja ekkor a felső levélemeletek és a kalász védelme kalászfuzárium, illetve szeptóriás és pirenofóras levélbetegségek, valamint a rozsdabetegségek ellen.
- a **Pointer Star** ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer felhasználható kalászosokban magról kelő kétszikű gyomok ellen posztemergens alkalmazással a célkultúra 3 leveles állapotától a zászlóslevél stádiumig általánosan a kétszikű gyomok 2-4 leveles, illetve *Galium aparine* esetében 1-3 levélörvös, *Cirsium arvense* esetében a tölevélrózsás állapotban 28 g/ha Ally Max SX és 0,3 l/ha Starane 250 EC felhasználásával. A *Galium aparine* által erősen fertőzött területeken a *Starane 250 EC* felhasználási dózisa 0,6 l/ha,
- a **Granstar SuperStar** ikercsomagolású gyomirtószer felhasználható őszi búzában a magról kelő kétszikű gyomok ellen posztemergens alkalmazással a célkultúra 3 leveles állapotától a zászlóslevél stádiumig általánosan a kétszikű gyomok 2-4 leveles, illetve *Galium aparine* esetében 1-3 levélörvös, *Cirsium arvense* esetében a tölevélrózsás állapotban 50 g/ha Granstar Super 50 SX és 0,3 l/ha Starane 250 EC felhasználásával. A *Galium aparine* által erősen fertőzött területeken a *Starane 250 EC* felhasználási dózisa 0,6 l/ha. A gyomirtószer hatásfokozására 0,1 %-os nem ionos nedvesítő szer hozzáadása szükséges,
- a **Granstar Super 50 SX** gyomirtószer felhasználható őszi búzában a magról kelő kétszikű gyomok ellen posztemergens alkalmazással a célkultúra 3 leveles állapotától a zászlóslevél stádiumig általánosan a kétszikű gyomok 2-4 leveles, illetve *Galium*

aparine esetében 1-3 levélörvös, *Cirsium arvense* esetében a tölevélrózsás állapotban 40-60 g/ha dózisban. A *Galium aparine* által erősen fertőzött területeken a fejlettebb gyomok ellen fluroxipir hatóanyagú készítmény 75-125 g/ha dóziséval kombinációban célszerű kijuttatni.

A légi kijuttatásnál a felhasználható permetlémennyiség 50-60 l/ha.

Kalászosokban a felhasznált készítményre kötelezően előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő (ÉVI):

Készítmény	ÉVI (nap)	Előírt MRL hatóanyagokként, kultúránként (mg/kg)
Granstar SuperStar	nincs	<i>tifenzulfuron-metil 0,05 (őszi búza, árpa)</i> <i>tribenuron-metil 0,01 (őszi búza)</i> <i>fluroxipir 0,1 (őszi búza)</i>
Pointer Star	nincs	<i>metszulfuron-metil 0,05 (őszi búza)</i> <i>tribenuron-metil 0,01 (őszi búza)</i> <i>fluroxipir 0,1 (őszi búza)</i>
Granstar Super 50 SX	nincs	<i>tifenzulfuron-metil 0,05 (őszi búza, árpa)</i> <i>tribenuron-metil 0,01 (őszi búza)</i>
Alert S	28	<i>fluzilazol, karbendazim 0,1mg/kg (búza, árpa, őszi, tavaszi)</i>
Harvesan	42	<i>fluzilazol, karbendazim 0,1mg/kg (őszi búza, árpa)</i>
Alert Solo	42-60	<i>fluzilazol 0,1 mg/kg (búza, árpa, tritikálé, napraforgó)</i> <i>famoxadon 0,05 mg/kg, cimoxanil 0,1 mg/kg (napraforgó)</i>
Charisma	28	<i>fluzilazol 0,1mg/kg famoxadon 0,02 mg/kg (búza, árpa, őszi, tavaszi, tritikálé)</i>

A felhasználók kötelesek a permetezés időpontjáról (a kezelés megkezdése előtt) tájékoztatni a területileg illetékes Megyei Kormányhivatalok Növény és Talajvédelmi Igazgatóságait.

Az eseti engedélyben jóváhagyott készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvőrendszabályokat szigorúan be kell tartani.

Jelen hatósági eljárás díja összesen 350.000 Ft, amelyet az ügyfélnek meg kell fizetnie.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Indokolás

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. április 13.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

Kapják: 1) ügyfél
2) irattár