



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 68335/2005

Tárgy: **Scotts gyep-műtrágya család**
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélye

Scotts International B.V. Magyarországi Képviselőlet
2092 Budakeszi, Erkel u. 26.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 7. §-a alapján a **Scotts gyep műtrágya család** 11761/2002 FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel

módosítom és egységes szerkezetben adom ki:

1. Gyártó: Scotts Europe B.V.
Nijverheidweg 1-5., 6422. PD Heerlen,
Hollandia
Statisztikai számjel: NL 003383441 B01
Képviselőlet: Scotts International B.V. Magyarországi Képviselőlet
2092 Budakeszi, Erkel u. 26.
Statisztikai számjel: 30006281-9900-116-13

2. Terméktípus: mikroelemmel dúsított komplex NPK műtrágya

Vámtarifaszám: 31052010 minden termék, kivéve
31021090 (Scotts gyep-műtrágya 16-0-0 + Fe)
31059091 (Scotts gyep-műtrágya 15-0-29)

3. Előírt minőségi feltételek

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: fehéres-barna, sárgás-barna színű, műtrágya szagú granulátumok

nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	2,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,4-6,5 ± 0,5
As tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)sz.a.	legfeljebb	20,0
Co tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	50,0

Pb tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	5,0

Sierrablen, Sierrablen Plus, Sportsmaster, Fairwaymaster, Scotts Díszpark és Substral készítmények (2-3 hónap és 8-9 hónap közötti hatástartam)

szemcseméret eloszlás		
0,8-4,0 mm között (m/m%)	legalább	96,0
0,8 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	4,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 – 38,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)sz.a.		0,0 – 25,0
K ₂ O tartalom (m/m%)sz.a.		0,0 – 29,0
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 5,0
Fe tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 5,0

Sierraform, Substral és Scott Díszpark készítmények (8-10 hét hatástartam)

szemcseméret eloszlás		
0,7-2,0 mm között (m/m%)	legalább	96,0
0,7 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	4,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 – 40,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)sz.a.		0,0 – 26,0
K ₂ O tartalom (m/m%)sz.a.		0,0 – 29,0
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 5,0
B tartalom (m/m%)sz.a.		0,0 - 0,5
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 1,5
Fe tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 5,0
Mn tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 1,0
Mo tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 0,5
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 1,5

Greenmaster, Sportsmaster és Substral készítmények (burkolatlan)

szemcseméret eloszlás		
0,7-2,0 mm között (m/m%)	legalább	96,0
0,7 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	4,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 – 26,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)sz.a.		0,0 – 20,0
K ₂ O tartalom (m/m%)sz.a.		0,0 – 26,0
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 5,0
B tartalom (m/m%)sz.a.		0,0 - 0,5
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 1,5
Fe tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 5,0
Mn tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 1,0
Mo tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 0,5
Zn tartalom (m/m%) sz.a.		0,0 - 1,5

Sierrablen Flora Tablet és Scott Díszpark készítmények (5-6 hónap és 12-14 hónap közötti hatástartam)

szemcseméret eloszlás kúpos alakúra préselt granulátumok	
N tartalom (m/m%) sz.a.	0,0 – 28,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)sz.a.	0,0 – 26,0
K ₂ O tartalom (m/m%)sz.a.	0,0 – 29,0
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	0,0 - 5,0
B tartalom (m/m%)sz.a.	0,0 - 0,5
Cu tartalom (m/m%) sz.a.	0,0 - 1,5
Fe tartalom (m/m%) sz.a.	0,0 - 5,0
Mn tartalom (m/m%) sz.a.	0,0 - 1,0
Mo tartalom (m/m%) sz.a.	0,0 - 0,5
Zn tartalom (m/m%) sz.a.	0,0 - 1,5

4. Felhasználható

Gyeppek, füvesített területek (parkok, pihenőkertek, közterületek, sportpályák, golf-pályák) műtrágyázására a vetést megelőzően vagy felülkezelésre. Az alkalmazás gyakorisága a hatástartamtól függ. Telepítést megelőzően vagy beállott gyepknél az első kaszálás előtt, a későbbiekben pedig kaszálásuk után szükséges a készítményt kijuttatni. Ha az alkalmazás után nincs csapadék, 10-15 mm-es beöntözés szükséges.

Sierrablen, Sierrablen Plus, Sportsmaster, Fairwaymaster, Scotts Díszpark és Substral készítmények (2-3 hónap és 8-9 hónap közötti hatástartam)

2-3 hónap hatástartammal

- magvetésre 30-35 g/m²,
- gyepszőnyeg fektetésre 30-35 g/m²,
- fenntartó műtrágyázásra 30-35 g/m²,

4-5 hónap hatástartammal

- magvetésre 30-50 g/m²,
- gyepszőnyeg fektetésre 30-50 g/m²,
- fenntartó műtrágyázásra 35-50 g/m²,

5-6 hónap hatástartammal

- magvetésre 30-60g/m²,
- gyepszőnyeg fektetésre 30-60 g/m²,
- fenntartó műtrágyázásra 35-60 g/m²,

8-9 hónap hatástartammal

- magvetésre 40-80 g/m²,
- gyepszőnyeg fektetésre 40-80 g/m²,
- fenntartó műtrágyázásra 40-80 g/m² mennyiségben.

Sierraform, Substral és Scott Díszpark készítmények (8-10 hét hatástartam)

- magvetésre 30-35 g/m²,
- gyepszőnyeg fektetésre 30-35 g/m²,
- fenntartó műtrágyázásra 25-40 g/m²,

Greenmaster, Sportsmaster és Substral készítmények (burkolatlan)

- magvetésre 20-25 g/m²,
- gyepszőnyeg fektetésre 20-25 g/m²,
- fenntartó műtrágyázásra 20.30 g/m²,

Sierrablen Flora Tablet és Scott Díszpark készítmények (5-6 hónap és 12-14 hónap közötti hatástartam)

Díszfák, díszcserjék telepítéskor a törzstől 10-15 cm-re 10 cm-es mélységben az ültető gödörbe helyezve:

5-6 hónap és 8-9 hónap hatástartammal 7,5 g/törzskerület cm mennyiségben,
12-14 hónap hatástartammal 15 g/törzskerület cm mennyiségben.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

- S 1/ 2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély (lásd: általános eljárás) után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg. A porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén por elleni légzésvédő. Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható. Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben az illetékes természetvédelmi igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály

8. Eltarthatóság

Száraz, hűvös, fedett helyen eredeti csomagolásban (0,25—0,5-2,5-3-5-7,5-10-15-20-25 kg-os polietilén zacskóban illetve zsákban, dupla papírsákban illetve kartondobozban, a tabletták 6-8-10-12-15-20-24-25-50-100-160 db/csomagos kiszerezésben) 5 évig eltartható.

9. Egyéb előírások

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2006. március 26.

Az engedélyokirat kiadásával egyidejűleg a **11761/2002** FVM számú engedélyokirat hatályát veszti. A készítmények 2005. december 31-ig az eredeti okiratszám feltüntetésével is forgalmazható.

Budapest, 2005. április. 13

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)