



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ÜGYINTÉZŐ: Baranyi Tibor
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1482-2/2016.
OLDALAK SZÁMA: 3
MELLÉKLET: 1. számú melléklet

**TARGY: Tanos 50 DF, Acanto 250 SC és
Callisto 4 SC növényvédő szerek**
szükséghelyzeti, felhasználási engedélye ipari
és étkezési mákban
(Máktermelők és Termelésszervezők Országos
Szövetsége)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, (továbbiakban: engedélyező hatóság), a Máktermelők és Termelésszervezők Országos Szövetsége (5836 Dombegyház, Béke u. 15.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a Máktermelők és Termelésszervezők Országos Szövetsége integrátori köréhez tartozó termelők (1. számú melléklet) részére szükséghelyzeti felhasználásra a **Tanos 50 DF** gombaölő permetezőszert ipari és étkezési mákban az **Acanto 250 SC** gombaölő permetezőszert ipari mákban és a **Callisto 4 SC** gyomirtó szert ipari mákban

engedélyezi

2016. május 1-jétől július 31-ig

(Tanos 50 DF, Acanto 250 SC)

és

2016. március 1-jétől június 30-ig

(Callisto 4 SC)

A fentiek értelmében a **Tanos 50 DF** 12.051/2002. FVM számú, az **Acanto 250 SC** gombaölő permetezőszer 46.445/2004. FVM számú és a **Callisto 4SC** gyomirtó permetezőszer 47.154/2004. FVM számú engedélyokiratában foglaltaktól eltérően felhasználható a kérelmező integrátori köréhez tartozó felhasználók területén szükséghelyzeti engedéllyel ipari és étkezési céltermesztésű mák kultúrában. Az **Acanto 250 EC** és **Callisto 4 SC** esetében felhasználható csak ipari mákban mákperonoszpóra, helmintospórium, pleospórás betegség, korompenész (*Peronospora arborescens*, *Helminthosporium spp.*, *Pleospora calvescens stb.*) és magról kelő kétszikű gyomok ellen, összesen 4000 ha területen.

A kérelmező integrátori körének a felelősségére:

- a **Tanos 50 DF** gombaölő permetezőszer felhasználható megelőző módon előrejelzés alapján ipari és étkezési mákban, mákperonoszpóra, helmintospórium, pleospórás betegség és korompenész ellen a mák szárba indulásától a „kampósbot” stádiumig 1-2 alkalommal 0,4 kg/ha dózisban 300 l/ha permetlével.

Mákban előírászerű felhasználásnál élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) **56 nap**, a megengedett szermaradék határértéket az *Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete* állapítja meg.

- az **Acanto 250 SC** gombaölő permetezőszer felhasználható megelőző módon előrejelzés alapján ipari mákban, mákperonoszpóra, helmintospórium, pleospórák betegség és korompenész ellen a mák szárba indulásától a „kampósbot” stádiumig 1-2 alkalommal 0,75-1,0 l/ha dózisban 300 l/ha permetlével.

Mákban előírászerű felhasználásnál é.v.i. betartása nem szükséges, a megengedett szermaradék határértéket az *Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete* állapítja meg. *A kezelt termés élelmezési és takarmányozási célra nem használható fel. Kizárólag gyógyszeripari célú felhasználásra forgalmazható!*

- a **Callisto 4 SC** gyomirtó permetezőszer felhasználható mákban magról kelő kétszikű gyomnövények ellen preemergensen és posztemergensen, egyszeri vagy osztott kezelés formájában 0,3 l/ha, illetve osztottnál (0,2+0,1 l/ha) dózisban 250-300 l/ha permetlével. A preemergens kijuttatás esetén a készítményt a mák vetését követő 3 napon belül kell kipermetezni. Állománykezelést egyszeri kijuttatás esetén a mák 4-6 valódi leveles fejlettségénél kell elvégezni, mert ilyenkor a legerősebb a védetséget biztosító viaszréteg. Osztott kezelés esetén az első kezelést a mák 2-4 valódi leveles fenológiai állapotában kell elvégezni 0,2 l/ha dózissal, a második kezelést a mák 4-6 valódi leveles állapotában 0,1 l/ha dózissal. A posztemergens kijuttatásnál a mák levelein sárgás, fehér foltok jelenhetnek meg, de ezek a kultúrnövény fejlődési ütemét nem befolyásolják, a tüneteket a mák maradéktalanul kinövi. Osztott kezeléssel jobb a szelektivitás, és fokozottabb a gyomnövények elleni biológiai hatékonyság. Egy tenyészidőszakban a Callisto 4 SC-vel végzett kezelés nem haladhatja meg a 0,3 l/ha mennyiséget.

Ipari céltermesztésű mák előírászerű felhasználásánál élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) nem szükséges. *A kezelt termés élelmezési és takarmányozási célú felhasználása tilos!*

Az érintett felhasználók kötelesek a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti szervét.

A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

Az eljárás illetékmentes.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Indokolás

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2016. március 8.

dr. Oravecz Márton
elnök
névében és megbízásából

Jordán László
igazgató