



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu);  
[ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Előadó: Talabér Cecília**

**Iktatószám: 04.2/878-2/2016.**

**Oldalak száma: 4 oldal**

**Melléklet: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat***

**Tárgy: Amistar gombaölő  
permetezőszer** forgalomba hozatali  
és felhasználási engedélyének  
módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Syngenta Kft.** (1117, Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt **Syngenta AG** (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek az **Amistar gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

## **h a t á r o z a t o t :**

Az engedélyező hatóság az **Amistar gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló **35042/2001. FVM** számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja, és a jelen határozat mellékletét képező engedélyokiratot a módosításokkal egységes szerkezetben adja ki:

*I. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

**5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**

**5.1. Veszélyességi besorolás:**

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):

**>2000 mg/ttkg**

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:**

**kifejezetten veszélyes**

**Méhveszélyesség:**

**nem jelölésköteles**

**Tűzveszélyességi besorolás:**

**nem jelölésköteles**

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

**GHS Piktogram**



**Figyelmeztetés:      Figyelem**

**Figyelmeztető mondatok (H-mondat):**

**H400\***      Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

**H410**      Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

\*Címkén nem feltüntetendő adat

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):**

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.  
**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

**Különleges S-mondatok:**

- SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

**5.2. Várakozási idők:**

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	É.v.i. (nap)
paradicsom (szabadföldi), paprika, tojásgyümölcs, uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék	3
újhagyma, zöldbab, retek	7
sárgarépa, petrezselyemgyökér, paszternák, torma, cukorrépa, cékla, takarmányrépa, feketegyökér	10
burgonya, vöröshagyma, fokhagyma, mogoróhagyma, fejtett bab, cukorborsó, káposztafélék, saláta, endívia, rukkola, zellergumó, zellerlevél, petrezselyemlevél	14
póréhagyma, repce, olajretek	21
komló	28
száraz hüvelyesek, kalászosok	35
dohány, dísznövények	nem szükséges
spárga	előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

**5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés

5.3.1.1. Előkészítőknak: növényvédelmi védőruha, védőkesztyű

5.3.1.2. Kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkesztyű

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

#### 5.3.2. Elsősegélynyújtás:

*Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

#### 5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

## II. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

### 6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 6.1. A kiszerelés térfogata:  | 12x1 l; 4x5 l; 1x20 l; 20x200 ml; 50 ml; 10 ml      |
| 6.2. A csomagolóanyag anyaga: | műanyag ampulla/flakon/kanna, papír gyűjtőkartonban |

Az engedély módosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Az ügyfél a **2016. június 30**-a után gyártott tételeket a jelen határozatnak megfelelő címkével köteles forgalomba hozni. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus formában az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2016. március 21.

**Dr. Oravecz Márton**

elnök

nevében és megbízásából:

**Jordán László**


igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselte
2. Irattár

(87/2016.)



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu); [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

---

---

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRAT**

**1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:**

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 35042/2001. FVM
- 1.2. Növényvédő szer neve:** Amistar
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2018. július 31.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** Syngenta AG  
CH-4002 Basel, Svájc
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** Syngenta Kft.  
1117, Budapest, Alíz u. 2.

**2. A növényvédő szer adatai:**

- 2.1. Növényvédő szer gyártója:** Syngenta AG  
CH-4002 Basel, Svájc
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése:** gombaölő permetezőszer
- 2.3. Növényvédő szer formulációja:** vizes szuszpenzió koncentrátum, SC
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:**
- |                                    |           |  |
|------------------------------------|-----------|--|
| 2.4.1. Hatóanyag                   | ISO név   | azoxistrobin   |
|                                    | CAS szám  | 131860-33-8  |
|                                    | IUPAC név | metil (E)-2-(2-(6-(2-cianofenoxi)-pirimidin-4-iloxi-fenil)-3-metoxiakrilát |
| tiszta hatóanyag részaránya        |           | 250 g/l  |
| technikai hatóanyag specifikációja |           | Syngenta által benyújtott A II dokumentáció tartalmazza                    |

**3. Az előírt minőségi követelmények:**

- 3.1. Hatóanyag tartalom**
- 3.1.1. azoxistrobin (HPLC) 22,8 ± 1,4 %(m/m)
- 3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:** Meg kell feleljen az „SC” formuláció FAO követelményeinek

**4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges szer permetlé mennyisége	
		l/ha	l/ha
<b>kalászosok</b> ( <i>búza, árpa, tritikále, rozs, zab</i> )	levél-és kalászbetegségek	0,75-1,0	250-400
<b>burgonya</b>	burgonyavész, alternária	0,75-1,0	400-600
<b>cukorrépa</b>	lisztharmat, cercospora	0,75-1,0	400-600
<b>cékla, takarmányrépa</b>	cercospora, rozsda lisztharmat, peronoszpóra	1,0	400-600
<b>repce, olajretek</b>	alternária, foma, fehérpenész, szürkepenész	1,0	250-400
<b>dohány</b>	peronoszpóra	0,75-1,0	400-600
<b>paradicsom</b> (szabadföldi), <b>tojásgyümölcs</b>	lisztharmat, paradicsomvész, alternária, szeptória	0,75-1,0	szf.: 400-500 h.: 500-1500
<b>paprika</b> (hajtatott)	lisztharmat, alternária, szürkepenész	0,75-1,0	500-1500
<b>vöröshagyma, fokhagyma, újhagyma, mogyoróhagyma, póréhagyma</b>	peronoszpóra, szürkepenész	0,75-1,0	400-500
<b>hüvelyesek</b> ( <i>száraz bab, száraz borsó, lencse, zöldbab, fejtett bab, cukorborsó</i> )	rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohítás foltosság	0,75-1,0	400-600
<b>sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék</b>	peronoszpóra, lisztharmat	0,75-1,0	400-600
<b>uborka, cukkini</b>	peronoszpóra, lisztharmat, szürkepenész	0,5-0,75 0,75	600-1500
<b>fejes káposzta, kelkáposzta, bimbós kel, kínai kel, karfiol, brokkoli, karalábé</b>	peronoszpóra, alternária	0,75	400-800
<b>saláta</b> (szabadföldi), <b>endívia, rukkola</b>	peronoszpóra, szürkepenész	0,75	400-600
<b>komló</b>	peronoszpóra, lisztharmat	1,0	800-1200
<b>spárga</b>	rozsda	1,0	500-1000
<b>sárgarépa</b>	lisztharmat, alternária, sztemfílium, szürkepenész, fehérpenész	1,0	400-600
<b>petrezselyem, paszternák</b>	peronoszpóra, lisztharmat, szeptória, szürkepenész, fehérpenész	1,0	400-600
<b>zeller</b>	szeptória, lisztharmat, szürkepenész, fehérpenész	1,0	400-600
<b>torma</b>	fehér sömör, lisztharmat, cercospora	1,0	400-600
<b>retek, feketegyökér</b>	peronoszpóra	1,0	400-600
<b>dísznövények</b>	lisztharmat, rozsda, peronoszpóra, szürkepenész, alternária	0,75-1,0	500-1500

Házikerti felhasználás: 7 – 10 ml / 4-10 l víz / 100m<sup>2</sup>

**A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:**

kultúra	kezelések maximális száma	kezelések közötti időtartam	az utolsó felhasználás fenológia szerint
kalászosok	2	10	virágzás
burgonya	3	7	sorzaródás vége
cukorrépa	2	7	gyökérfejlődés kezdete
cékla, takarmányrépa	3	7	gyökérfejlődés kezdete
repce, olajretek	2	20	érés kezdete
dohány	2	7	virágzás
paradicsom (szabadföldi), tojásgyümölcs	3	8	50 %-os érés
paprika (hajtatott)	2	7	50 %-os érés
vöröshagyma, újhagyma, póréhagyma	3	7	héjképződés
fokhagyma, mogyoróhagyma	2	7	héjképződés
száraz borsó, száraz bab, lencse	2	10	hüvelyek 50 %-a végleges nagyságú
zöldbab, cukorborsó	2	10	hüvelyek 30 %-a végleges nagyságú
fejtett bab	2	10	érés kezdete
dinnye-, tökfélék	3	7	50%-os érés
uborka, cukkini	3	7	érés kezdete
fejes káposzta, bimbós kel	3	7	50 %-os fejméret
kelkáposzta, kínai kel, karalábé, brokkoli, karfiol	2	7	50 %-os fejméret
saláta, endívia, rukkola	3	7	50 %-os fejméret
komló	3	10	tobozfejlődés
spárga	3	10	nincs korlátozás (spárgasípok betakarítása után)
sárgarépa	3	10	80 %-os gyökérvastagság
petrezselyem, paszternák	2	10	80 %-os gyökérvastagság
zeller	2	10	80 %-os gyökérvastagság
torma	2	10	80 %-os gyökérvastagság
retek, feketegyökér	2	10	80 %-os gyökérvastagság
dísznövények	2	10	nincs korlátozás

**Előírt növényvédelmi technológia:**

**Kalászosokban** a védekezést a fertőzési helyzettől függően egy vagy két alkalommal javasolt elvégezni. A korai betegségek ellen már a szárbaindulás kezdetén célszerű a készítmény használata. A második védekezést a kalászhányás végén - virágzás elején szükséges elvégezni a különböző levél- és kalászbetegségek ellen. Kalászfuzáriózis ellen - különösen járványveszélyes időben – más hatásmechanizmusú, fuzárium ellen hatásos fungiciddal együtt kombinációban kell használni.

**Burgonyában** a készítményt a burgonyavész, valamint alternáriás betegség ellen megelőző jelleggel kell kijuttatni. Az első permetezést 6-7 leveles állapotban lehet elvégezni, majd két alkalommal, 7-14 naponként meg lehet ismételni. A rezisztencia elkerülése miatt más hatásmechanizmusú készítménnyel váltogatva kell használni.

**Cukorrépában** a lisztharmat kezdeti tüneteinek megjelenésekor ajánlott elkezdni a védekezést. Cerkospóra ellen preventív módon kezeljük. Erős fertőzésveszély esetén ajánlatos még egy alkalommal kijuttatni, úgy, hogy a két kezelés között más hatásmechanizmusú gombaölő szereket alkalmazunk.

**Céklában és takarmányrépában** levélbetegségek ellen a kezelést a betegségek első tüneteinek megjelenésekor célszerű megkezdni. A készítményt más hatásmechanizmusú gombaölő készítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 7-10 napos időt öleljen fel.

**Repcében és olajretekben** a készítményt legfeljebb két alkalommal lehet felhasználni. Őszi kezeléskor, korai levélbetegségek ellen 4-8 leveles állapotban célszerű védekezni. Tavasszal a szárbainduláskori és a virágzáskori kezelés a levél- és szárbetegségek ellen hatásos.

**Dohányban** peronoszpóra ellen a védekezést megelőző jelleggel célszerű megkezdni, majd 7-14 nap elteltével, szükség esetén meg kell ismételni.

Szabadföldi **paradicsomban** és **tojásgyümölcsben** a lisztharmat, a paradicsomvész, az alternáriás és szeptóriás betegség kezdeti tüneteinek megjelenésekor ajánlott megkezdni a védekezést. A további szükséges védekezések esetén más hatásmechanizmussal rendelkező gombaölő készítményekkel váltogatva kell használni, 8-14 napos permetezési fordulóval.

**Hajtatott paprikában** lisztharmat ellen az állománykezeléseket a fertőzési nyomás ismeretében, a kezdeti tünetek megjelenését követően legfeljebb 2 alkalommal, 10-12 napos permetezési intervallumban lehet elvégezni. A további szükséges kezelések más hatásmechanizmusú gombaölő szerekkel történjenek. A virágzás és terméskötődés időszakában végzett kezelések egyben a korai szürkepenész elleni védelmet is elősegítik.

**Hagymafélékben** hagymaperonoszpóra ellen a kezeléseket preventív módon, előrejelzés alapján célszerű elkezdni, és a hagyma növekedési időszakáig 2-3 alkalommal, július végéig, a fertőzés alakulásának megfelelően kell folytatni. *A készítmény tapadásfokozó szer alkalmazása nélküli is megfelelő permetléfedettséget biztosít.*

Száraz és cukorborsóban, **babban** és **lencsében** lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás foltosság és rozsdá ellen az állománypermetezéseket a kezdeti tünetek megjelenése előtt, megelőző módon, virágzás körül ajánlott elkezdni és a fertőzés alakulása szerint a hüvelyképződési időszakban még egy további kezelés lehet szükséges.

**Dinnye- és tökfélékben** preventív módon kell megkezdni a védekezést, és a szert más gombaölő hatásmechanizmussal rendelkező készítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 7-14 napos időt öleljen fel.

Szabadföldi **uborkában** és **cukkiniben** a védekezést megelőző módon célszerű elkezdni 4 leveles állapot körül, és egészen terméskötődésig folytatni. A készítményt más hatásmechanizmusú gombaölő készítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló - a fertőzés erősségétől függően - 7-14 napos időt öleljen fel. Hajtatásban a védekezéseket 2-3 alkalommal termésnövekedés, érés idején ajánlatos végezni, 7 napokénti ismétléssel. A készítménnyel történő kezelések között más hatásmechanizmusú gombaölő szereket alkalmazzunk. Fertőzésveszély esetén a magasabb dózist célszerű alkalmazni.



**Káposztafélékben** a permetezéseket a peronoszpóra és az alternária tüneteinek megjelenése előtt a palántanevelés időszakában 2-4 leveles és kiültetés előtti állapotban kell elvégezni. Kiültetett állományban 8-10 leveles állapot körül a védekezéseket megelőző módon javasolt végrehajtani, és a fertőzési nyomás ismeretében 7-12 naponként fejesedés, illetve karfiolnál virágrózsa növekedési időszak végéig lehet folytatni. A *permetléhez nedvesítőszer hozzáadása javasolt*.

Szabadföldi **salátában**, **endíviában** és **rukkolában** a szürkerothadás elleni permetezést a palánták tápkockákba tűzdelése, valamint kiültetése után közvetlenül, majd 7 nap múlva célszerű végezni, nagy lémenyiséggel. A peronoszpóra elleni védekezést 2-3 leveles korban kell elkezdni. A készítményt más hatásmechanizmusú gombaölő készítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 7-10 napos időt öleljen fel.

**Komlóban** a peronoszpóra és a lisztharmat fertőzésének kezdetekor kell megkezdni a védekezést. A készítményt más hatásmechanizmusú gombaölő készítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 10-12 napos időt öleljen fel.

**Spárgában** a rozsda fertőzésének kezdetekor célszerű megkezdni a védekezést. A készítményt más hatásmechanizmusú gombaölő készítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 10-12 napos időt öleljen fel.

**Sárgarépában** az első tünetek megjelenésekor kell megkezdni a védekezést, és más hatásmechanizmussal rendelkező gombaölő készítményekkel váltogatva kell használni. A permetezési forduló 10-12 napos időt öleljen fel.

**Petrezselyemben** és **paszternákban**, **zellerben**, **tormában**, **retekben**, **feketegyökérben** és **dísznövényekben** az első tünetek megjelenésekor kell védekezni, majd 10-14 nap elteltével, szükség esetén meg kell ismételni azt.

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

## 5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

### 5.1. Veszélyességi besorolás:

#### 5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):

>2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

#### 5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram



Figyelmeztetés:

Figyelem

**Figyelmeztető mondatok (H-mondat):**

- H400\*** Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):**

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.  
**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

**Különleges S-mondatok:**

- SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

**5.2. Várakozási idők:**

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	É.v.i. (nap)
paradicsom (szabadföldi), paprika, tojásgyümölcs, uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék	3
újhagyma, zöldbab, retek	7
sárgarépa, petrezselyemgyökér, paszternák, torma, cukorrépa, cékla, takarmányrépa, feketegyökér	10
burgonya, vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma, fejtett bab, cukorborsó, káposztafélék, saláta, endívia, rukkola, zellergumó, zellerlevél, petrezselyemlevél	14
póréhagyma, repce, olajretek	21
komló	28
száraz hüvelyesek, kalászosok	35
dohány, dísznövények	nem szükséges
spárga	előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

\* Címkén nem feltüntetendő adat

### **5.3. Munkaegészségügyi óvőrendszabályok:**

#### *5.3.1. Egyéni védőfelszerelés*

*5.3.1.1. Előkészítőknak:* növényvédelmi védőruha, védőkesztyű

*5.3.1.2. Kijuttatóknak:* növényvédelmi védőruha, védőkesztyű

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

#### *5.3.2. Elsősegélynyújtás:*

*Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

### **5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

## **6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:**

*6.1. A kiszerelés térfogata:* 12x1 l; 4x5 l; 1x20 l; 20x200 ml; 50 ml; 10 ml

*6.2. A csomagolóanyag anyaga:* műanyag ampulla/flakon/kanna, papír gyűjtőkartonban

## **7. A növényvédő szer eltarthatósága:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

## **8. Forgalmazási kategória: III.**

Budapest, 2016. március 21.

**Dr. Oravecz Márton**

elnök

nevében és megbízásából:

**Jordán László**

igazgató

*P.H.*