

## A háztartási ecet (ételecet) felhasználási feltételei

### A készítmény felhasználható:

- magvak csávázására,
- vágóeszközök fertőtlenítésére.

**Rendeltetés:** gomba- és baktériumölő hatással rendelkező csávázó- és fertőtlenítő szer.

### Felhasználási technológia:

#### A háztartási ecet:

- **búzafélék:** közönséges búza (*Triticum vulgare*), őszi búza (*Triticum aestivum*), durumbúza (*Triticum durum*) és tönkölybúza (*Triticum spelta*) magjainak csávázására kő- és porüszögök ellen,
- **árpa** (*Hordeum vulgare*) magjainak csávázására pirenofórás levélcsíkosság (helmintosporiózis) ellen,
- **zöldségfélék** közül a sárgarépa (*Daucus carota*), paradicsom (*Solanum lycopersium*) és paprika félék (*Capsicum* spp.) magjainak csávázására altenáriás fertőzés ellen szabadföldi termesztésben,
- **zöldségfélék** közül a sárgarépa (*Daucus carota*), paradicsom (*Solanum lycopersium*) és paprika félék (*Capsicum* spp.) valamint káposztafélék (*Brassica olearacea*) magjainak kezelésére a baktériumok (*Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, *Pseudomonas syringae* pv. *tomato*, *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria*) és gombák (*Botrytis aclada*) okozta fertőzések ellen szabadföldön és hajtatott körülmények között

használható fel.

A csávázást a háztartási ecet (5-10% töménységű) és víz 1:1 arányú keverékével (liter/liter) szükséges végrehajtani. A magvakat vetés előtt közvetlenül (őszől tavaszig) a készítmény oldatába kell meríteni, majd rövid áztatás után abból kivenni. A gabonafélék csávázása során 100 kg maghoz 1 liter oldatot kell felhasználni.

A vágóeszközök fertőtlenítése az alábbi növénykultúrák betegségei ellen javasolt:

- Fehér és hússzínű **vadgesztenyében** (*Aesculus* spp.), valamint **juharfélékben** (*Acer* spp.) baktériumos fertőzés (pl.: *Pseudomonas syringae* pv. *aesculi*) ellen.
- **Rózsafélék** (Rosaceae) közül **galagonyában** (*Crataegus* spp.), **fanyarkában** (*Amelanchier*), **törpe berkenyében** (*Aronia*), **japánbirsben** (*Chaenomeles*), **madárbirsben** (*Cotoneaster*), **birsben** (*Cydonia*), **almában** (*Malus*), **korallberkenyében** (*Photinia*), **pimpófélekben** (*Potentilla*), **szilvafélékben** (*Prunus*), **tűztövisben** (*Pyracantha*), **körtében** (*Pyrus*), **rózsában** (*Rosa*), **berkenyékben** (*Sorbus*) és **gyöngyvesszőben** (*Spiraea*) tüzelfalás (*Erwinia amylovora*) ellen.

- Az *Acer*, *Cotoneaster*, *Euonymus*, *Forsythia*, *Magnolia*, *Philadelphus*, *Populus*, *Prunus*, *Pyrus*, *Rosa*, *Rubus*, *Syringa* és *Vaccinium* nemzetségbe tartozó **dísznövényekben** bakterimos elhalás (*Pseudomonas syringae* pv. *syringae*) ellen.
- **Platánfélékben** (*Platanus*), **szilvafélékben** (*Prunus*), **szelídgesztenyében** (*Castanea*), **vadgesztenyében** (*Aesculus*), **japánakácban** (*Sophora*) fák korhadását okozó taplófélék (pl.: *Phellinus* sp., *Fomes fomentarius*) ellen.
- **Szilfélékben** (*Ulmus* spp.) szállítószöveteket fertőző gombák (*Ophiostoma* spp.) ellen.
- **Juharfélékben** (*Acer* spp.) és **bálványfában** (*Ailanthus altissima*) hervadást okozó gombák (*Verticillium* spp.) ellen.
- **Juharfélékben** (*Acer*), **szelídgesztenyében** (*Castanea*), **vadgesztenyében** (*Aesculus*) és **bükkfélékben** (*Fagus*) kriptosztrómás kéregelhalás (*Cryptostroma corticale*) ellen.

A fertőtlenítéséhez **50 ml 8%-os töménységű háztartási ecetet 1 liter vízben** kell feloldani. A metszésre és fűrészelésre szolgáló eszközöket minden használat előtt, de naponta legalább egyszer a készítmény oldatával le kell mosni, majd fél percig száradni hagyni.

Az Európai Bizottság felülvizsgálati jelentése a háztartási ecetről [innen](#) letölthető.