

A hagymakivonat felhasználási feltételei

A készítmény: Étkezési vöröshagymából készített vizes főzet

Rendeltetés: kórokozó gombák fertőzésének mérséklésére

Felhasználási technológia:

Főzet készítése

A főzet előállításához 500g felaprított hagymát 10 l forrásban lévő vízhez kell adagolni. Tíz perc forralást követően a főzetet 15 percig állni kell hagyni, majd fém szűrőn keresztül le kell szűrni. Az így nyert főzetet az elkészítést követő 24 órán belül fel kell használni.

Főzet felhasználása

A vöröshagyma vizes főzetéből **1%-os töménységű (100 ml főzet/10 l víz) permetlevet** kell készíteni, amelyet permetezéssel szükséges a növények lombzatára kijuttatni az alábbi táblázatban leírtaknak megfelelően.

Kultúra	Betegség	A kezelések évenkénti / termesztési időszakonkénti száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges permetlé	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
<i>szabadföldi burgonya</i>	alternáriás betegség	3-5	7	6-10 l/100 m ²	az első oldalhajtások megjelenésétől (BBCH21) – bogyóérésig (BBCH85)
<i>szabadföldi és hajtatott paradicsom</i>	fitoftórási betegség (paradicsomvész)	3-5	3	10-15 l/100 m ²	elsődleges oldalhajtások megjelenésétől (BBCH21) az ötödik bogyó, vagy ötödik paradicsomfűrt bogyóinak kifejlődéséig (BBCH 75)
<i>szabadföldi és hajtatott uborka</i>	bottrítiszes betegség (szürkepenész)	3-5	7	10-15 l/100 m ²	elsődleges oldalhajtások megjelenésétől (BBCH21) a főszáron elhelyezkedő ötödik termés végső méretének eléréséig

					(BBCH 75)
--	--	--	--	--	-----------

A vöröshagyma főzetének 1%-os oldatát tartalmazó permetlével burgonyában és uborkában 7-10 naponta, paradicsomban 4-7 naponta javasolt permetezéseket végrehajtani. Az első kezelést megelőző jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor indokolt elvégezni. A felhasznált permetlé mennyiségét, a megadott értékhatárokon belül, a kezelendő lombfelület nagyságához szükséges igazítani. Törekedni kell a teljes és egyenletes permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.