

## Hidrogén-peroxid felhasználási feltételei

**A készítmény:** <5 %-os koncentrációjú kész hidrogén-peroxid oldata.

**Rendeltetés:** gombák és baktériumok ellen felületi fertőtlenítésre

### Felhasználási technológia:

**Burgonyafélék közé tartozó zöldségekben** (pl. paradicsom, kaliforniai paprika, tölténivaló paprika) a művelőeszközök (pl. metszőolló) fertőtlenítésére alkalmazandó talajlakó baktériumok (pl.: *Ralstonia solanaceum*), és *Botrytis* fajok (pl.: *Botrytis cinerea*) ellen. Az eszközöket minden egyes használat előtt a készítmény 15-30 g/l koncentrációjú oldatába kell áztatni. Az áztatás után az eszközökkel végzett munkák megkezdése előtt fél perces várakozási időt szükséges tartani.

A készítmény vetés előtti magkezelésre ajánlott **salátafélékben** baktériumos levélfoltosság (pl.: *Xanthomonas campestris* pv. *vitians*) és **virágáért termesztett lágyszárú kultúrákban** (pl.: rézvirág) vetőmaggal is terjedő gombák (különösen *Alternaria* és *Fusarium* fajok) ellen. A magvakat közvetlenül a vetés előtt salátaféléknél a készítmény 10-15 g/l koncentrációjú, virágoknál a készítmény 25-49 g/l koncentrációjú oldatában kell 5-15 percen keresztül áztatni.

Az Európai Bizottság felülvizsgálati jelentése a hidrogén-peroxid oldatáról [innen](#) letölthető.